




- ۱۲- هنگام تغییر وضعیت، حرکات خود را کاملاً آهسته انجام دهید
- ۱۳- در صورت پیدایش تهوع، پزشک را مطلع کنید
- ۱۴- در هنگام سرگیجه، دراز بکشید و چشمان خود را ببندید
- ۱۵- در هنگام راه رفتن از نگاه کردن به پائین خودداری کنید
- ۱۶- از بلند کردن اجسام سنگین خودداری کنید.

- ۴- به مدت یکماه از فین کردن شدید بپرهیزید
- ۵- به مدت یکماه از مسافرت با هواپیما و استفاده از آسانسورهای سریع السیر خودداری کنید
- ۶- ممکن است تا یک هفته پس از عمل جراحی مختصری ترشح خونابه ای از گوش داشته باشید .
- ۷- ممکن است تا ۴ هفته پس از عمل جراحی صداهای خاصی را در گوش خود بشنوید .
- ۸- در صورتی که لاله گوش شما پس از برداشتن بخیه ها متورم و دردناک شده است، حتماً به پزشک مراجعه نمائید .
- ۹- یک روز پس از برداشتن بخیه ها می توانید استحمام کنید، اما با پنبه آغشته به وازلین استریل یا پماد تتراسایکلین پوستی، مانع ورود آب به داخل مجرای گوش شوید .
- ۱۰- استحمام در طول هفته اول از گردن به پائین اشکالی ندارد
- ۱۱- داروهای خود را به دقت مصرف نموده و از مصرف داروهایی که سبب اختلال انعقادی می شوند (مثل وارفارین هپارین و آسپرین) به مدت یک هفته خودداری نمائید .



سایت بیمارستان از طریق لینک
WWW.GMU.AC.IR و ورود به پورتال بیمارستان
علامه بهلول گنابادی قابل دسترسی می باشد.

ارتباط با ما و پاسخگویی به سوالات:

تلفن: ۰۵۱۵۷۲۳۶۸۳۵

داخلی:

تمپا نوپلاستی
(ترمیم پرده گوش)


تهیه کننده: عصمت مختاری



تمپا نوپلاستی (ترمیم پرده گوش):

پرده گوش در انتهای کانال گوش قرار دارد و گوش میانی را از گوش خارجی جدا می کند.

پارگی پرده گوش عبارت است از پاره شدن پرده نازک گوش که در قسمت های داخلی تر گوش قرار دارد .



علل پارگی پرده گوش :

-ضربه محکم به روی گوش مثلاً یک سیلی محکم
_هنگام شکستگی جمجمه

-در نزدیکی محل انفجار بودن

-اگر جسم نوک تیزی مثل سوزن یا هر وسیله دیگر عمیقاً وارد کانال گوش شود

-در اثر ورود قطعات داغ هنگام جوشکاری و یا ورود مواد اسیدی به داخل گوش

-عفونت گوش میانی



علائم پارگی پرده گوش:

درد ناگهانی در گوش

کاهش شنوایی

خونریزی یا ترشح از گوش. ترشح گوش ممکن

است در عرض ۲۴ تا ۴۸ ساعت پس از پارگی، شبیه

چرک شود

وزوز گوش

سرگیجه

برای پیشگیری از پارگی پرده گوش چه باید کرد؟

هیچ شیئی را درون مجرای گوش فرو نکنید.

از صدماتی که ممکن است باعث پاره شدن پرده گوش شوند اجتناب کنید

در صورت بروز عفونت گوش میانی، سریعاً برای درمان مراجعه کنید

درمان پارگی پرده گوش:

در اکثر موارد پارگی پرده گوش به درمان نیازی ندارد .



در صورت مشاهده عفونت گوش میانی آنتی بیوتیک تجویز می شود تا به طور کامل بهبود یابد.

در اکثر موارد درمان پارگی پرده گوش بهتر است که از وارد شدن آب به درون گوش جلوگیری کنید و همچنین از گوش پاک کن پنبه ای یا موارد مشابه استفاده نکنید. در صورتی که به دارو جواب نداد ممکن است جراحی برای ترمیم آن پیشنهاد شود

درمان جراحی به روش انجام تمپانوپلاستی یا عمل ترمیم پرده گوش می باشد

مراقبتهای بعد از عمل ترمیم پرده گوش:

۱-رژیم غذایی شما محدودیتی ندارد،

امادرسورت داشتن درد هنگام جویدن غذا، سعی کنید بیشتر از مایعات و غذاهای نرم استفاده کنید

۲-به مدت یکماه از تماس با افراد سرماخورده بپرهیزید و خود را نیز در معرض هوای سرد قرار ندهید.

۳-هنگام عطسه کردن بینی خود را نبندید، با دهان باز عطسه و سرفه کنید.