



فشار خون

تهیه کننده:

مهین رضانی اول (کارشناس پرستاری)

ویراست علمی:

سوپروایزر آموزشی / سوپروایزر آموزش سلامت



۱ - در برنامه روزانه خود حتماً زمانی را جهت ورزش اختصاص دهید. (حداقل ۳۰ دقیقه و به طور منظم و در روزهای مشخص)

- سعی کنید دستگاه فشار سنج تهیه نموده و یکی از اعضای خانواده تان طرز کار با آن را فرا گیرد.

- داروهای خود را به موقع مصرف نمایید و از قطع، کاهش و یا افزایش آن بدون مشورت با پزشک خود جداً خودداری نمایید.

- قرار ملاقات با پزشک خود را فراموش نکنید.

- مطمئن شوید که پدر و مادر، برادران، خواهران، بچه ها فشار خون خود را مرتباً چک می کنند.

- در هر حال سرزنده به زندگی ادامه دهید و شاداب باشید.

منبع: پرستاری برون-سودارث

ارتباط با ما و پاسخگویی به سوالات:

تلفن: ۰۵۱۵۷۲۳۶۸۳۵

داخلی: ۱۳۰۰



توصیه های خود مراقبتی:

- از استعمال دخانیات جداً پرهیزید.

- سعی کنید عصبانی نشوید، به خود مسلط باشید و از رفتن به محیط های ناآرام، شلوغ و یا جاهایی که فکر می کنید شما را ناراحت می کند اجتناب ورزید.

- چنانچه عصبانی شدید، چند نفس بلند بکشید و به خود یادآوری نمایید که سلامتی شما مهمتر است.

- چنانچه وزن اضافی دارید به تدریج وزن خود را با رژیم غذایی مناسب و ورزش منظم کاهش دهید.

تعریف فشار خون:

فشار خون نیرویی است که خون بر روی دیواره رگ‌ها اعمال می‌کند. هر بار که قلب می‌تپد، خون را به درون شریان‌ها تلمبه می‌کند و این باعث ایجاد فشار خون می‌شود.



منظور از فشار خون بالا چیست؟

بطور کلی فشار خون ۱۲۰ / ۸۰ میزان فشار خون طبیعی و فشار خون بالاتر از ۱۴۰ / ۱۰۰ برای بالغین غیر طبیعی محسوب می‌شود و در نتیجه آن خطر بروز بیماری‌های قلبی - عروقی افزایش پیدا می‌کند.

طبقه بندی فشارخون		
طبقه	سیستول (عدد بالا) mmHg	دیاستول (عدد پایین) mmHg
مطلوب/طبیعی	کمتر از 120	کمتر از 80
پیش فشارخون بالا	120 - 139	80 - 89
فشار خون بالا		
مرحله 1	140 - 159	90 - 99
مرحله 2	160 و یا بیشتر	100 و بیشتر

۱

علل:

- معمولاً ناشناخته است. تعداد کمی از موارد در اثر مشکلات زیر ایجاد می‌شوند:
- بیماری مزمن کلیه
- تنگی و گرفتگی عروق
- سن بالای ۶۰ سال
- چاقی، سیگار کشیدن، استرس
- وابستگی به الکل
- رژیم غذایی حاوی نمک یا چربی اشباع شده زیاد
- کم تحرکی
- آرتر

علائم شایع:

- معمولاً علامتی وجود ندارد مگر این که بیماری شدید باشد
- سردرد، خواب آلودگی، گیجی
- کرختی و مور مور شدن دستها و پاها
- سرفه خونی، خونریزی از بینی
- تنگی نفس شدید

۲

عوارض:

- سکتة مغزی
- حمله قلبی
- نارسایی کلیه

چند توصیه غذایی:

- از گوشت مرغ و ماهی که چربی اشباع شده کمتری نسبت به گوشت قرمز دارند استفاده نمایید.
- سعی نمایید از غذاهای کم نمک استفاده کنید و یا حداقل سر سفره به غذای خود نمک اضافه ننمایید.
- بجای استفاده از روغن نباتی جامد، روغن حیوانی و دنبه و کره، از روغنهای مایع مانند آفتاب گردان و زیتون استفاده نمایید.
- مصرف میوه ها و آب آنها را (به شرط اینکه خود تهیه کرده باشید) افزایش دهید بخصوص : زردآلو، موز، طالبی، آلوزرد، میوه های خشک مثل آلو و کشمش.



۳