

آموزش به بیمار برای مراقبت از cvline

تهیه کننده: معصومه میربیدختی

ویراست علمی:

سوپروایزر آموزشی، سوپروایزر آموزش سلامت



مددجوی گرامی شما می توانید با مراجعه به آدرس اینترنتی www.gmu.ac.ir و انتخاب مرکز آموزشی، پژوهشی درمانی علامه بهلول گنابادی از منوی شبکه ها و مراکز درمانی و مراجعه به واحد آموزش سلامت به سایر مطالب آموزشی دسترسی پیدا کنید.

ارتباط با ما و پاسخگویی به سوالات:

تلفن: ۰۵۱۵۷۲۳۶۸۳۵

بخش داخلی یک : 1188


۵



۸. در صورت مرطوب شدن پانسمان فوراً آن را تعویض کنید.

۹. از بلند کردن اشیای سنگین با بازویی که لوله در آن کار گذاشته شده خودداری شود.
۱۰. نام و شماره تلفن تماس پزشک یا

پرستار خود را برای تماس و سوال در مواقع ضروری بدانید و همواره همراه خود داشته باشید.



۴



لوله ورید مرکزی

لوله ورید مرکزی لوله ایست که از جنس سیلیکون ساخته شده و نرم می باشد. این لوله دسترسی به سیاهرگ ها را آسان می کند و مسیری را فراهم می کند تا بتوان بدون صدمه زدن به رگ ها به صورت مداوم و یا پی در پی داروها و یا دیگر محلول ها را به بیمار تزریق کرد.

نکات مهم:

۱. در ۴۸ ساعت ابتدایی پس از قراردادن لوله روزی ۲ الی ۲ بار و هر بار به مدت ۲۰ دقیقه بر روی محل گذاشتن لوله از گرمای مرطوب استفاده شود تا خطر ایجاد فلبیت (قرمزی و سفت شدگی) محل لوله کاهش یابد.
۲. پانسمان محل لوله گذاری شده هر روز تعویض شود.
۳. هرگونه از علائم زیر را فوراً به پزشک یا پرستار خود گزارش کنید.



الف: هرگونه قرمزی - درد در محل وارد کردن

لوله یا بالای این محل و یا درد در سطح شانه

- ❖ تورم و قرمزی بازو
- ❖ ترشح از محل وارد کردن لوله
- ❖ ناتوانی برای هیپارینه کردن لوله یا کشیدن خون از لوله
- ❖ شل شدن و یا پاره شدن بخیه های محل لوله گذاری

ب: علائم هشدار دهنده عمومی شامل:

- ❖ درجه حرارت بیش از 38 درجه سانتیگراد
- ❖ کوتاهی تنفس
- ❖ درد سینه
- ❖ داروها توسط پرستار مراقبت بهداشتی در منزل و یا در ویزیت های کلینیک تجویز خواهد شد



۴. در صورتی که تجویز برخی داروها با اجازه پزشک معالج توسط خود بیمار در منزل انجام می شود در مورد تعداد داروها، نحوه حل کردن داروها و آماده سازی داروها و عوارض جانبی داروها حتماً با پزشک یا پرستار خود مشورت کنید.

۵. در صورتی که داروها توسط خود بیمار در منزل تجویز می شود در مورد نحوه ی شستشو و هیپارینه کردن لوله با پزشک یا پرستار خود مشورت کنید.

۶. هرگونه جا بجایی غیر طبیعی محل لوله فوراً گزارش شود.

۷. بیمار می تواند حمام کند. ولی در هنگام حمام کردن باید روی پانسمان محل لوله گذاری شده، و با یک کیسه پلاستیکی پوشانده شود

