




Bohlool Hospital

مراقبت از سی وی لاین



تهیه کننده: محصومه میربیدختی

واحد آموزش سلامت

بازنگری خرداد ۹۸

۴. در صورت بروز تب، همراه با هر یک از علائم بالا

۵. اگر مقداری از کاتتر که بیرون از پوست شماست به نظر بلندتر شده باشد

۶. اگر کاتتر به صورت ناگهانی و تصادفی کشیده شده باشد و در اطراف ناحیه ورود کاتتر خونریزی مشاهده شود.

۷. اگر دچار تنگی نفس و یا سرفه های مکرر شدید.

ارتباط با ما و پاسخگویی به سوالات:

تلفن: ۰۵۱۵۷۲۳۶۸۳۵

داخلی: ۱۱۸۸

۵. مواظب باشید کاتتر کشیده یا تا نشود.

۶. دستهای خود را مخصوصاً پس از توالت با آب و صابون بشوید

۷. در صورت مرطوب شدن پانسمان فوراً آن را تعویض کنید.

۸. هرگز پیچ های سر لوله ها را دستکاری نکنید و اگر باز شد، سریع ببندید.

هرگونه از علائم زیر را فوراً به پزشک یا پرستار خود گزارش کنید:

۱. هرگونه قرمزی یا درد در محل

وارد کردن لوله یا بالای این محل و یا

درد در سطح شانه

۲. تورم و قرمزی بازو

۳. ترشح از محل وارد کردن لوله

لوله ورید مرکزی یا سی وی لاین :

لوله ورید مرکزی لوله ایست که از جنس سیلیکون ساخته شده و نرم می باشد. این لوله دسترسی به سیاهرگ ها را آسان می کند و مسیری را فراهم می کند تا بتوان بدون صدمه زدن به رگ ها به صورت مداوم و یا پی در پی داروها و یا دیگر محلول ها را به بیمار تزریق کرد.

این نوع از کاتترها جزو کاتترهای موقت دسته بندی می شوند و برای کاربرد در تزریق دارو یا مایعات، مانیتورینگ فشار، تزریق خون و استفاده می شوند؛ که می توانند تک راه - دو راه - سه راه - چهار راه - و در برخی از برندهای تجاری ۵ راه و ۷ راه باشند. بیشترین کاربرد آن در بخش مراقبت های ویژه، اورژانس و اتاق عمل است.

از مهمترین عوارض کارگذاری آن ها می توان به عفونت های مرتبط با کاتترهای ورید و نموتوراکس (ورود هوا به فضای ریه) اشاره کرد.

نکته) با رعایت بهداشت مناسب دست ها، به کارگیری حداکثر احتیاطات در هنگام کاتترگذاری، استفاده از ضد عفونی کننده پوست کلرگزیدین و بازبینی روزانه از روی نیاز به کاتتر به کاهش خطر عفونت کمک خواهد کرد.

نکته) پس از کاتترگذاری انجام یک گرافی ساده قفسه سینه جهت ارزیابی عوارض و قرارگیری صحیح کاتتر لازم است.

نکته) برای گذاشتن آن نیاز به بیهوشی نیست و با بی حسی موضعی انجام می شود. بعد از بی حسی، از طریق یک برش کوچک یک سر کاتتر به داخل رگ هدایت می شود و سر دیگر آن چند سانتیمتر خارج از پوست بخیه می شود.

نکات مهم:

1. پانسمان محل لوله گذاری شده هر روز تعویض شود.

2. هرگونه جا بجایی غیر طبیعی محل لوله فوراً گزارش شود.

3. بیمار می تواند حمام کند ولی در هنگام

حمام کردن باید روی پانسمان محل لوله گذاری شده، و با یک کیسه پلاستیکی پوشانده شود.

4. بعد از حمام پانسمان تعویض شود.

