



# رادیوگرافی

رادیولوژی معمولی یا پرتونگاری ساده اولین گام تشخیصی برای بیشتر بیماریهاست. رادیوگرافی معمولی تصاویر دو بعدی از راه ثبت اختلاف جذب اشعه ایکس توسط بافتهای مختلف تهیه می شود. رادیوگرافی که با استفاده از ماده حاجب انجام شود به رادیوگرافی رنگی معروف است.

## گرافی ساده شکم ( KUB )

پرتونگاری از شکم در مواردی مانند آپاندیسیت کولیک نفرتیک - تصادف - بلع اجسام خارجی - انواژیناسیون - پیچ خوردگی روده و غیره که آزمایش جنبه فوری دارد و زمان بسیار مهم است، آزمایش بدون هیچ آمادگی قبلی انجام می شود.

## اروگرافی ( IVP ) Intra venous Pyelogram

اروگرافی روش رادیولوژی تشخیصی است که دستگاه ادراری بعد از تزریق ماده حاجب بهتر نمایان می شود. در این روش برای نشان دادن طرز کار لگنچه ها و حالها از ماده حاجب استفاده میشود که از طریق داخل وریدی به بیمار تزریق می شود.

## آمادگی پیش از انجام گرافی IVP، ساده شکم و لومبوساکرال ( گرافی از ستون فقرات کمری)

۱. حدود ساعت ۷:۳۰ شب قبل از انجام رادیوگرافی، شام ساده و سبکی (سوپ رقیق) میل کنید.
۲. سپس یک عدد شیشه روغن کرچک کامل (حدود ۷۰ گرم) میل نمایید.
۳. آب و مایعات (ترجیحاً مایعات گرم) فراوان نوشیده شود (به جز شیر و نوشابه)
۴. هنگام مراجعه به بخش تصویربرداری ناشتا باشید
۵. در صورت لزوم از قرصهای بیزاکودیل و دایمتیکون طبق دستور پزشک استفاده نمایید.
۶. توجه به این نکته ضروری است در صورتی که درخواست اورژانس گرافیهای فوق الذکر باشد، نیاز به دادن آمادگی به بیمار نیست.
۷. داروهای خود را طبق برنامه همیشگیتان مصرف کنید؛ البته به جز متفورمین و ایندراول. (قطع این داروها از ۴۸ ساعت قبل از انجام آزمون الزامی است و مصرف دوباره قرص متفورمین به شرط عملکرد طبیعی کلیه ها پس از انجام آزمون با تزریق ماده حاجب بلامانع است. مصرف مجدد قرص ایندراول بعد از آزمون آزاد است).

