




Bohlool Hospital

عفونت ادراری



بخش اورژانس

واحد آموزش سلامت—تاریخ تدوین: آبان ۹۸

- بالافصله پس از احساس نیاز به دفع و پر شدن مثانه ادرار کنید و ادرار خود را برای مدت طولانی نگه ندارید.

- پس از دفع ادرار و مدفوع، ناحیه‌ی تناصلی را از جلو به سمت عقب بشویید تا آلدگی مدفعی به مجاری ادرار منتقل نشود (در خانم‌ها).

- برای شستشوی ناحیه‌ی تناصلی از صابون‌ها و شوینده‌های معطر استفاده نکنید و در وان حاوی کف زیاد برای مدت طولانی نشینید.

- از شوینده‌های بهداشتی زنانه استفاده نکنید.

- در صورت بروز علائم عفونت دستگاه تناصلی زنانه (ترشح و خارش) حتماً به متخصص زنان مراجعه و هر چه سریع تر آن را درمان کنید.

- لباس زیر کاملاً نخی بپوشید. و لباس زیر تنگ و چسبان نپوشید.

- به خانم‌ها توصیه می‌شود از پوشیدن شلوارهای تنگ و چسبان (به خصوص شلوارهای جین) به مدت طولانی و یا هنگام استراحت خودداری کنند.

- رژیم غذایی خود را به شکلی تنظیم کنید که از بروز بیوست جلوگیری کند، بیوست مزمن با ایجاد فشار باعث تخلیه‌ی ناکامل مثانه می‌شود.

- میوه‌ها و آبمیوه‌های ترش مثل مرکبات، قره قورت، لیمو ترش میل کنید، این مواد با اسیدی کردن ادرار می‌توانند شانس بروز عفونت را کاهش دهند هرچند اثر قطعی آن اثبات نشده است.

- اگر به بیماری‌های مزمن مانند دیابت یا بیماری‌های منجر به ضعف سیستم ایمنی مبتلا هستید و یا داروهای سرکوب کننده‌ی سیستم ایمنی (مثل کورتون خوراکی) مصرف می‌کید، در صورت ابتلاء به عفونت ادراری، جهت پیش‌گیری از تکرار عفونت یا مزمن شدن آن با پزشک متخصص مشورت کنید اما به هیچ وجه شخصاً اقدام به تعییر میزان یا قطع مصرف داروهای خود نکنید.

- در صورتی که چندین سال قبل یائسه شده اید و به طور مکرر دچار علائم ادراری مثل سوزش و تکرر ادرار می‌شوید به متخصص زنان مراجعه کنید، در برخی موارد با تجویز پمادهای زنانه هورمونی (استروژن و اینتال) این علائم بهبود می‌یابند.

- برخی از خانم‌ها اغلب اوقات دچار آلدگی میکروبی ادرار بدن ایجاد علائم ادراری هستند، وجود این حالت باید پیش از بارداری یا در اولین فرصت پس از شروع بارداری مشخص و درمان شود تا ادرار از هرگونه آلدگی میکروبی پاک گردد، اگر قصد بارداری دارید در این مورد با پزشک خود مشورت و آزمایش ادرار لازم را انجام دهید.

- ترشح زیاد و خارش شدید مجرای ادراری آقایان اغلب نشانه‌ی عفونت‌های جنسی است و در این موارد توصیه می‌شود به پزشک متخصص کلیه و مجاری ادراری (اورولوژیست) مراجعه و درمان کامل انجام گیرد، گاهی در این موارد نیاز به بررسی و درمان همسر فرد نیز وجود دارد.

خطروناک است، بلکه در طول بارداری نیاز به بررسی و مراقبت و پیش‌گیر خواهد داشت.

۱۴. مصرف طولانی مدت آنتی‌بیوتیک در خانم‌ها گاهی ممکن است باعث تحریک بروز عفونت‌های قارچی زنانه شود، بنابراین در صورت بروز خارش شدید و ترشح سفید رنگ در طول مصرف آنتی‌بیوتیک به پزشک مراجعه کنید اما به هیچ وجه شخصاً اقدام به قطع مصرف دارو نکنید؛ صورتی که داروهای دیگری به طور دائم برای سایر بیماری‌ها مصرف می‌کنند (مثلاً داروهای قلبی یا ریقیک کننده‌ی خون) حتماً به پزشک اطلاع دهید چون ممکن است با آنتی‌بیوتیک تجویز شده ناسازگار باشد، به هیچ وجه شخصاً نحوه‌ی مصرف دارو را تغییر ندهید.

۱۵. اگر در اورژانس برای شما آزمایش ادرار یا سونوگرافی انجام شده است، برگه‌ی نتیجه آن را دور نینهادزید، چون در صورت مزمن شدن یا تکرار عفونت جهت بررسی‌های تکمیلی به این نتایج برای مقایسه نیاز است.

۱۶. معمولاً علائم ۱-۲ روز بعد از آغاز درمان شروع به کاهش و بهبود می‌کنند.

در صورت بروز هر یک از علایم زیر مجدداً به اورژانس یا پزشک مراجعه کنید:

- عدم بهبود علائم یا تشدید آن پس از ۲ روز درمان

- بروز علائم جدید و اضافه شدن به علائم قبلی

- درد شدید پهلوها و کمر

- بروز یا تشدید تب و لرز یا ادامه‌ی تب پس از ۲ روز از شروع درمان با آنتی‌بیوتیک

- تهوع و استفراغ شدید

- عدم توانایی خوردن یا نوشیدن

- بی‌حالی و کاهش سطح هوشیاری

- عدم بهبودی کامل پس از ۲ هفته

بروز بثورات و ضایعات پوستی مثل کهپر که می‌تواند نشانه‌ی حساسیت به آنتی‌بیوتیک باشد

جهت پیش‌گیری از بروز عفونت ادراری در آینده به موارد زیر

توجه کنید: - حجم زیادی از میانات بتوشید، روزانه حداقل ۸-۱۰ لیوان آب بنوشید - ۶-۸ لیوان در طول روز و ۱-۲ لیوان پیش از خواب، در صورتی که فعالیت جسمی زیاد دارید یا در آب و هوای گرم هستید نیاز به میانات افزایش می‌یابد، نشانه‌ی کافی بودن مصرف آب دفع ادرار شفاف و روشن (بی‌رنگ یا زرد روشن) و حداقل یک نوبت بیدار شدن برای دفع ادرار در طول شب.

نمایید و سپس شروع به ادار کردن نموده و ابتدای ادار خود را دور بریزید و از
وسط جریان ادار شروع به جمع آوری آن در ظرف آزمایش کنید.

پس از ترجیح تا زمان بهبودی به نکات و توصیه های زیر توجه کنید:

۱. آب زیاد بتوشید، جریان زیاد ادار باعث شسته شدن میکروب ها از داخل
مجاری ادراری می شود.

۲. در صورت تجویز آنتی بیوتیک دارو را دقیقا در زمان معین مصرف کنید و
حتما دوره ای درمان را تا پایان کامل کنید، این زمان معمولاً ۳-۷ روز است ولی
در مورد عفونت های شدید که کلیه ها را درگیر می کند ۱۰-۱۴ روز ادامه
می یابد. مصرف غلط آنتی بیوتیک ها باعث مقاوم شدن میکروب ها، باقی ماندن
میکروب ها و افزایش احتمال تکرار عفونت در آینده می شود.

۳. ممکن است داروهایی برای بهبود سوزش و درد هنگام دفع ادار برای شما
تجویز شده باشد (مثل فناور پریدین)، این داروها می توانند به طور طبیعی باعث
تغییر رنگ و رنگی شدن ادار را شوند، در این صورت نگران نباشید و مصرف دارو
را ادامه دهید

۴. استراحت کافی داشته باشید تا بدن شما قدرت کافی برای مبارزه با میکروب
ها را داشته باشد.

۵. از انجام ورزش های سنگین خودداری کنید، فعالیت جسمانی زیاد باعث
تشدید برخی علائم مثل ضعف و بی حالی شده و هم چنین با افزایش میزان
تعربیق باعث کم آبی بدن میشود.

۶. نوشیدن زیاد قهوه، نسکافه و سایر نوشیدنی های حاوی کافئین زیاد تا زمان
بهبود، ممکن است با تحریک مثانه باعث تشدید علائم شود.

۷. از مصرف زیاد انواع شکلات، غذاهای تند و پرادویه و نوشیدنی های گازدار
(مثل نوشابه) خودداری کنید

۸. میوه ها و آبیوه های ترش و حاوی ویتامین ث مثل مرکبات و آب پرتقال
بیشتر مصرف کنید.

۹. در صورت وجود درد یا تب بهتر است از استامینوفن و ترکیبات آن استفاده
کنید.

۱۰. کیسه های آب گرم یا حوله های گرم باعث تسکین درد شکم و پهلوها می
شود.

۱۱. ادار خود را نگه ندارید و در صورت احساس نیاز به دفع ادار سریعاً این کار
را انجام داده و مثانه خود را به طور کامل تخلیه کنید.

۱۲. اگر احتمالاً باردار هستید حتماً به پزشک اطلاع بدهید (حتی اگر مطمئن
نیستید)، چون نه تنها مصرف بعضی از آنتی بیوتیک ها در دوران بارداری

۲ - احساس باقی ماندن ادار در مثانه پس از تخلیه ای ادار / قطره قطره
ادرار کردن / بی اختیاری ادار / شب اداری

۳ - کدر و غیر شفاف شدن یا تغییر رنگ و بد بو شدن ادار / خون در ادار

۴ - احساس سنگینی و فشار در لگن و پایین شکم / درد کمر و پهلو و
کشاله ای ران

۵ - خارش ناحیه ای تناسلی یا ترشح چرکی از مجرای ادراری در آقایان

۶ - تب (از تب خفیف تا تب و لرز شدید می تواند متغیر باشد)

۷ - تهوع و استفراغ / اسهال / بی اشتیاهی

۸ - احساس ضعف و خستگی / گیجی و کاهش سطح هوشیاری (در افراد
مسن)

از انجا که این علائم در بیماری های دیگری به جز عفونت ادراری نیز
دیده می شوند، در صورت بروز هر یک از این علائم حتی اگر سابقه ای
قبلی ابتلاء به عفونت ادراری دارد حتماً به پزشک مراجعه کنید تا همه ای
تشخیص های احتمالی بررسی شود.

تشخیص :

- تشخیص عفونت ادراری معمولاً بر اساس شرح حال، وجود علائم، معاینات
بالینی، وجود عوامل خطر و سابقه ای قبلی ابتلاء به عفونت ادراری است. ممکن
است پزشک برای تایید تشخیص و رد کردن سایر بیماری ها برای شما آزمایش
ادرار (از نظر بررسی وجود خون، قند، پروتئین، عفونت) و بررسی میکروبی یا همان
کشت ادرار (به خصوص برای تعیین آنتی بیوتیک موثر و مناسب) درخواست کند.

گاهی ۱-۲ هفته پس از پایان درمان و بهبود علائم، پزشک آزمایش ادرار مجدد
درخواست می کند تا اطمینان حاصل شود که آلدگی میکروبی کاملاً برطرف شده
است، این کار به ویژه در زنان حامله و هم چنین افرادی که به طور مکرر دچار
عفونت ادراری می شوند یا علائم عفونت آنها پس از ۲ هفته کاملاً برطرف نشده
است اهمیت زیادی دارد.

- دقت کنید که انجام آزمایش خون، کشت ادرار و روش های تصویربرداری مثل
سوئنگرافی یا سی تی اسکن در بسیاری از موارد عفونت های ادراری لازم نیست و
تصمیم گیری در مورد لزوم انجام آن فقط بر عهده ای پزشک می باشد (مثلاً در
افرادی که دچار عفونت های ادراری مکرر می شوند یا در مواردی که شک به
وجود اختلال ساختمندی در دستگاه ادراری یا وجود یک عامل انسداد ادرار مانند سنگ و
وجود دارد). در این مورد به تصمیم پزشک خود اعتماد کنید. در
صورتی که آزمایش ادرار برای شما درخواست شده است برای نمونه گیری صحیح
باید ابتدا ناحیه ای تناسلی را به خوبی و از جلو به عقب بشویید و به آرامی خشک

عفونت ادراری یکی از شایع ترین بیماری ها و شکایات مراجعه کنندگان به
اورژانس ها و پزشکان و هم چنین شایع ترین اختلال مرتبط با سیستم ادراری
است و به معنای وجود میکروب در دستگاه ادراری می باشد. دستگاه ادراری
شامل کلیه ها، حلب ها، مثانه و مجرای ادرار است. شایع ترین علت بروز عفونت
ادراری آلدگی با میکروب های مذفوی است و در خانم ها به طور کلی شایع تر
از آقایان می باشد. عفونت ادراری انواع مختلفی داشته و می تواند کلیه ها، مثانه
یا پیشبراه (عفونت های جنسی در آقایان) را درگیر کند که از بین آن ها عفونت
مثانه بسیار شایع تر است.

وجود عوامل زیر باعث افزایش احتمال ابتلاء به عفونت ادراری و یا تکرار
آن (عفونت مکرر یا راجعه) می شود:

- خانم ها - حاملگی - یائسگی - افراد مسن - مصرف کم مایعات

- ادرار کردن با فاصله ای زیاد و طولانی و عدم دفع به موقع ادرار هنگام
احساس نیاز به دفع

- سطح پایین بهداشت و عدم رعایت مناسب اصول بهداشتی

- شستشوی غلط ناحیه ای تناسلی پس از دفع ادرار و مذفوی (بویژه در
خانم ها جهت شستشوی باید از سمت جلو به عقب باشد تا آلدگی -
مذفوی به مجرای ادرار منتشر نشود)

- افراد دارای سوند یا لوله های ادراری

- اختلالات ساختمندی دستگاه ادراری

- هر عاملی که باعث انسداد در دستگاه ادراری شود مثل سنگ های
ادراری

- بیماری های مزمن زمینه ای مثل دیابت

- ابتلاء به عوامل یا بیماری ها یا مصرف داروهایی که باعث ضعف، نقص
یا سرکوب سیستم ایمنی بدن شود

- اختلالاتی که باعث ناتوانی در تخلیه ای کامل ادرار می شود مثل:
بزرگی غده پروستات در آقایان و چسبندگی های رحمی و لگنی در خانم
ها

علائم ابتلاء به عفونت ادراری :

۱ - درد و سوزش هنگام ادرار کردن / تکرر ادرار / احساس فوریت در دفع
ادرار