


انحراف بینی (سپتوپلاستی)



کارگروه آموزش به بیمار بخش جراحی ۴
واحد آموزش سلامت-بازنگری سوم

بیشتر بیماران، پس از انجام سپتوپلاستی شاهد بهبود مشکلات گرفتگی بینی و رفع انسداد ناشی از انحراف سپتوم هستند. این بهبودی بستگی به شخص و وضعیت عمومی وی دارد و میزان آن در افراد مختلف متفاوت است.

در بسیاری از بیماران سردرد های ناشناخته که منشا آنها گرفتگی بینی بوده درمان خواهد شد.

ارتباط با ما و پاسخگویی به سوالات :

۰۵۱-۵۷۲۳۶۸۳۵

دسترسی به سایت بیمارستان و استفاده از مطالب آموزشی:

Www.bohlool.gmu.ac.ir


<https://www.mayoclinic.org>



نتایج سپتوپلاستی یا جراحی انحراف بینی:

نتایج جراحی سپتوپلاستی دائمی است و تا آخر عمر فرد را ساپورت می کند ولی ممکن است بسته به دلایلی، غضروف و تیغه حرکت کنند یا تغییر شکلی در طی زمان داشته باشند.

در این درمان مراحل بهبودی با کنیدی روبه رو است از این رو نتایج نهایی حدود یک سال پس از جراحی مشخص خواهد شد.



اقدامات قبل از عمل سپتوپلاستی:

- لازم است در ابتداء طی جلسه‌ای، در مورد مزايا و معایب اين جراحى بینى با پزشك خود صحبت کنيد. و در مورد سابقه پزشکى خود و جراحى های قبلى او را آگاه سازيد.
- آزمایش های فیزیکی که پزشك مطالبه کرده است را انجام داده و در اختیار او قرار دهید.
- از مصرف داروهای خاص که پزشك جراحتان ممنوع کرده خودداری نمایيد.
- استعمال دخانیات در روزهای قبل از عمل ممنوع است.

پس از عمل سپتوپلاستی:

- گاهی برای کاهش خونریزی و تورم بعد از عمل لازم است موادر زیر را رعایت نمایید:
- انجام فعالیتهای بدنه و ورزش های سنگین محدود شود.
- از فین کردن تا اتمام دوره بهبودی خودداری کنيد.
- در زمان خواب سر خود را بالا تر نگاه داريد می توان برای اين کار از دو بالش استفاده کرد.
- پس از خارج کردن مش، شسشوی بینى سه بار در روز با سرم نرمال سالين توصيه می شود.

چنانچه فرد با مشکل تنگی راه های تنفسی بینی رو بروست یا انحراف بینی او مشهود می باشد، می تواند از مزاياي جراحى انحراف بینى يا سپتوپلاستى بهره گرفته و به حالت ايده آل سلامتى خود دست يابد. لازم به ذكر است که تنفس ناقص بینى باعث به وجود آمدن ناهنجاري های بزرگی چون سردرد دائمي خواهد شد و نباید اين مسئله را دست کم گرفت.

جراحى سپتوپلاستى با توجه به ميزان پيچيدگى جراحى و انتخاب راهكارهای تيم پزشكى، نيازمند به بيهوشى عمومى يا بيحسى موضعی است.

همان طور که گفته شد، اين جراحى منجر به باز شدن راههای هوایي بینى و بهبود مشكلات تنفسی و حل وقفة تنفس در خواب خواهد شد.

عواض احتمالي:

جراحى انحراف بینى يا سپتوپلاستى تا کنون عواض به خصوصی در پی نداشته ولی ممکن است مانند تمام عمل های جراحى، پس از عمل، درد و تورم بینى و خونریزی را شاهد باشيم که با گذشت چند روز و کسب بهبودی بيشتر، اين مشكلات نيز به خودی خود برطرف خواهد شد.



جراحى انحراف بینى (سپتوپلاستى):

جراحى سپتوپلاستى با هدف رفع انحراف بینى و بهبود شرایط تنفسی و بویایی بیمار انجام می شود. سپتوم همان دیواره بینى است که انحراف آن به علت حرکت و جا به جايی بافت غضروف و استخوان ما بين سوراخهای بینى رخ می دهد. در عمل سپتوپلاستى وضعیت اين دیواره میانی اصلاح شده و توسط پزشك در جای مناسب خود قرار خواهد گرفت جهت انجام اين کار گاهی لازم است پزشك جراح بخش هایي از دیواره بینى را برداشته و حذف نماید.

قبل از انجام عمل سپتوپلاستى، برنامه ریزی هایي انجام می شود و طی آن برنامه ها جراح مواردي چون ساختار فیزیکی، مشكلات تنفسی و ویژگی های خاص بینى بیمار را ارزیابی می نماید.

چه زمانی لازم است جراحى سپتوپلاستى یا انحراف بینى صورت گیرد؟

در حالت معمول، به منظور حفظ توازن در جريان هوا و تعادل تنفسی، تیغه میانی بینى در خط مرکزی صورت قرار دارد اما گاهی در بعضی بیماران اين دیواره به یکی از طرفین انحراف دارد. چنین مشکلی می تواند باعث ایجاد موانع تنفسی و بروز هایي چون خون دماغ گردد.