



Bohlool Hospital

آندوسکوپی فوقانی



بخش داخلی یک

واحد آموزش سلامت—بازنگری ۱۴۰۰

- از بخش وپزشک معالج در مورد اینکه چه زمانی جواب نمونه آماده است سوال پرسید.

شما نیاز به مراقبت پزشکی دارید اگر:

- گلودرد بیش تر از یک روز طول بکشد
- بلع مشکل داشتید
- شما نیاز به مراقبت پزشکی فوری دارید در صورتی که علائم زیر را داشته باشید:
- بروز تب
- استفراغ خونی یا استفراغی که به نظر می رسد قهوه ای باشد.
- مدفوع خونی سیاه رنگ و یا قیری رنگ
- گلودرد شدید یا نداشتن توان بلع غذا
- تنفس سخت

آدرس وب سایت:

www.bohlool.gmu.ac.ir

ارتباط با ما و پاسخگویی به سوالات:

تلفن: ۰۵۱۵۷۲۳۶۸۳۵

روش انجام اندوسکوپی

- یک راه وریدی جهت تزریق دارو برای شما تعبیه می شود.
- اسپری بی حس کننده موضعی در حلق شما زده می شود.
- جهت آرام کردن شما ممکن است از آرام بخش استفاده شود.
- شما به پهلو می چپ می خوابید.
- پزشک شما لوله ی آندوسکوپ را از دهان شما عبور می دهد و از طریق مری پایین می برد.
- پزشک از اسکوپ جهت بررسی داخل مری و معده و دوازدهه شما استفاده می کند و نمونه نیز ممکن است گرفته شود.

بعد انجام آندوسکوپی

- به علت دریافت آرام بخش تا ۲۴ ساعت رانندگی نکنید.
- تا زمانی که اثر داروهایی که دریافت کرده اید از بین نرود، فشار خون ضربان قلب، تنفس و سطح اکسیژن خون شما بررسی می شود.

آندوسکوپی فوقانی

آندوسکوپی فوقانی روشی است که از آن جهت مشاهده بخش فوقانی دستگاه گوارش استفاده می شود.

در این روش پزشک شما یک لوله‌ی باریک و قابل انعطاف را از طریق دهان تان عبور می دهد و از مری به معده داخل می شود.

یک دوربین کوچک به انتهای لوله چسبیده است عکس ها با دوربین بر روی مانیتوری که در داخل اتاق آندوسکوپی نصب شده است نمایش داده می شود.

بخش فوقانی دستگاه گوارش شامل:

مری: لوله ای که غذا و مایعات را از حلق شما به معده می رساند که به آن مری می گویند.

معده: عضو توخالی، عضلانی و حجیمی از لوله گوارش است که نقش گوارش شیمیایی را بر عهده دارد. محافظه معده از بالا به مری و از پایین به دوازدهه مربوط می شود.

دوازدهه: قسمت ابتدایی روده باریک که به آن دوازدهه میگویند.



در طی انجام آندوسکوپی ، پزشک ممکن است تکه هایی از بافت را جهت فرستادن به آزمایشگاه و بررسی میکروسکوپی بافت شما نمونه برداری کند و در ظرف مخصوص جهت ارسال به پاتولوژی قرار دهد.

پزشک ممکن است جهت تشخیص سرطان بخش فوقانی دستگاه گوارش و همچنین جهت پیدا کردن علت مشکلات دیگر مانند:

- درد معده
- سوزش سردل
- درد یا مشکل هنگام بلع
- علت تهوع و استفراغ
- خونریزی از معده
- زخم معده

آندوسکوپی را انجام دهد.

قبل انجام آندوسکوپی شما باید موارد زیر را بدانید و اطلاع دهید:

هر گونه آلرژی یا حساسیت به داروی خاص هر گونه دارویی که مصرف می کنید:

شامل ویتامین ها ، قطره ها ی چشمی ، ویا هر دارویی که بدون نسخه پزشک استفاده می کنید و یا مصرف آسپرین و وارفارین

هر گونه اختلال خونی که دارید.
هرگونه جراحی قبلی که داشتید.
هر مشکل پزشکی قبلی
بارداری

خطرات و عوارض:

به طور کلی این روش بی خطر می باشد با این حال مشکلاتی ممکن است رخ دهد از جمله:

عفونت

خونریزی

واکنش حساسیتی به داروها

سوراخ یا پارگی در مری ، معده یا روده

آمادگی قبل انجام آندوسکوپی

دستور پزشک مربوط به نخوردن مواد غذایی را رعایت کنید که معمولاً از ۶ ساعت قبل از آندوسکوپی باید کاملاً ناشتا باشید.

از پزشک خود درمورد توقف یا ادامه مصرف داروهایی که مرتب مصرف می کنید سوال کنید در صورتی که داروی رقیق کنند خون مصرف می کنید این موضوع اهمیت بیشتری دارد.

همراهی داشته باشید.