

زخم بستر (زخم فشاری)



بخش جراحی ۲- واحد فیزیوتراپی

واحد آموزش سلامت - بازنگری ۱۴۰۰

مشاوره تغذیه برای بیمار مفید خواهد بود.

فیزیوتراپی در زخم بستر:

هدف اصلی فیزیوتراپی در زخم بستر، پیشگیری از بروز آن است. چرا که زخم بستر از عوارض ثانویه بسیاری از بیماریهایی است که باعث بی حرکتی یا فلج شده است.

تغییر وضعیت هر دو ساعت یکبار خصوصا در افرادی که برای مدت طولانی در بستر بوده و به دلیل ضعف قادر به حرکت نیستند، مانع از بروز زخم بستر می شود.

فیزیوتراپیست با آموزش برنامه تمرینی مناسب کمک می کند. که بیمار بتواند به طور مستقل تغییر وضعیت دهد تا از بروز زخم بستر یا پیشرفت آن جلوگیری شود.

نقش دیگر فیزیوتراپی کمک به درمان زخم بستر است، اگر به دلایلی زخم به وجود آمد، اقدامات فیزیوتراپی شامل تکنیکهای حرکت دادن مفاصل مختلف بدن در بستر، تکنیک های درمان دستی و استفاده از عوامل فیزیکی و حرارتی می باشد.

این روشها باعث افزایش جریان خون در ناحیه زخم، پاکسازی عفونت، کاهش تورم و جلوگیری از چسبندگی زخم به بافت های زیرین و تقویت عضلات اطراف می شود و در نتیجه به ترمیم زخم و جلوگیری از عمیق شدن آن کمک می کند.

زخم فشاری - دکتر محمد جواد فاطمی

iec.behdasht.gov.ir سایت آوای سلامت

www.rehab.iuims.ac.ir

آدرس وبسایت:

www.Bohloul.gmu.ac.ir

نکته مهم: ملحفه های تخت بدون چین و چروک و تمییز باشد و زیر بدن بیمار جمع نشود.

مراقبت از پوست برای پیشگیری از زخم بستر:

از پاک کننده ای با خاصیت اسیدی ملایم و مرطوب کننده مناسب جهت تمییز کردن پوست استفاده گردد. از آب داغ جهت تمییز کردن پوست استفاده نکنید.

استفاده از لایه های جاذب رطوبت، برای بیماران مبتلا به بی اختیاری مفید بوده و باعث کاهش تماس پوست با ادرار و مدفوع می شود.

فشار ناشی از ابزار و لوله ها، سوندها، گچ و... را رفع کرده یا به حداقل برسانید.

پیشگیری از تجمع رطوبت؛ زیرا جمع شدن رطوبت و ادرار، باعث افزایش نفوذپذیری پوست و اسیدی شدن محل، و تجمع مدفوع باعث تحریک پوست با تبدیل آنزیم اوره به آمونیوم شده و زمینه ساز زخم بستر است.

پیشگیری از زخم با مصرف آب و تغذیه کافی:

برای جلوگیری از یبوست در رژیم غذایی بیمار از سبزیجات و میوه جات استفاده کنید.

اجرای رژیم غذایی مناسب و غنی از ویتامین و پروتئین، مایعات کافی برای بیمار، در زمان لازم، چرا که بیماران دچار کم آبی و سوء تغذیه، در خطر بیشتری برای ابتلا به زخم فشاری هستند.

غذا در حجم کم و دفعات بیشتر به بیمار دهید و در صورت دستور پزشک، به بیمار ویتامین و مواد معدنی دهید.

در صورت عدم منع به بیمار خود مایعات فراوان دهید، به خصوص آب، حداقل ۸ لیوان در روز برای جلوگیری از خشکی پوست نوشیده شود.

زخم بستر (Bed Sore)

وقتی پوست، بافت‌های زیر پوستی و ماهیچه‌ها برای مدت طولانی تحت فشار قرار می‌گیرند، زخم بستر یا زخم فشاری به وجود می‌آید. زخم بستر در افرادی به وجود می‌آید، که برای مدت طولانی بی‌حرکت هستند.

انواع زخم بستر:

زخم بستر دونوع است: زخم سطحی، زخم عمقی

زخم بستر سطحی با آسیب پوست شروع می‌شود و در نهایت منجر به آسیب بافت‌های زیر پوستی می‌شود.

زخم عمقی از بافت‌های زیر پوستی و عمقی آغاز می‌شود و تنها علامت آن کمی قرمزی در سطح پوست است.

چه عواملی زمینه ساز زخم بستر است؟



- زخم بستر در هر سنی ممکن است اتفاق بیفتد اما در افراد سالمند، و افراد مبتلا به نارسایی قلب، دیابت، اختلالات کلیوی و گوارشی و سرطانها شایع‌تر است.
- زخم بستر در بیماران دچار آسیب‌های مغزی مانند سکته مغزی و فلج مغزی که اندام‌های فلج دارند، شایع است.
- در افراد بی‌حرکتی بعد از جراحی‌ها و شکستگی‌ها.
- بیماران بیهوش و بیمارانی که مدت طولانی در تخت بی‌حرکت هستند. مانند بیماران بخش آی سی یو
- افرادی که اختلال حسی دارند مانند آسیب‌های نخاعی یا ضایعات اعصاب محیطی.
- بیمارانی که ادم (ورم) دارند و دچار کمبود ویتامین و پروتئین هستند. بیمارانی که تب بالا، درد‌های شدید، سوء تغذیه، کم خونی دارند.

نواحی مستعد زخم فشاری:

زخم بستر بیشتر در نقاطی دیده می‌شود که پوست روی برجستگی‌های استخوانی واقع شده‌است. این نقاط عبارتند از:

- پشت سر، شانه، آرنج، دنبالچه و پاشنه پادر وضعیت طاقباز
- گوش، شانه، لگن، زانو، قوزک پا در وضعیت خوابیده به پهلو
- تیغه شانه، باسن، کف و پاشنه پا در وضعیت نشسته

نقاط در معرض خطر زخم فشاری



پیشگیری از زخم فشاری با ازمین بردن فشار:

روزانه ۲ تا ۳ بار مناطقی را که در معرض خطر زخم هستند، را بررسی کنید. به خاطر داشته باشید که، کشف به موقع علائم (قرمزی، سفتی، نرمی غیرعادی، سردی یا گرمی غیر عادی) از پیشروی زخم جلوگیری می‌کند.

در صورت عدم منع پزشکی، حداقل هر ۲ ساعت یکبار بیمار را بچرخانید. (برای جابجا کردن بیمار هر دو ساعت برنامه‌ریزی کنید). با جابجا کردن دمای سطح پوست تغییر می‌کند.

استفاده از تشک مواج مفید می‌باشد.

طول مدت زمانی که بیمار نیمه نشسته قرار دارد، را محدود کنید و به ۳۰ دقیقه برسانید. زیرا در وضعیت نیمه نشسته، بیمار به سمت پایین حرکت کرده و سر می‌خورد، که باعث اصطکاک بین پوست و تشک می‌شود.

اگر بیمار روی صندلی چرخدار نشسته است، هر ۱۰ تا ۱۵ دقیقه با کمک دست‌ها، نشیمنگاه را از صندلی بلند کند تا از فشار آزاد شود.

بیمار را در هنگام جابجایی، به جای کشیدن روی تخت، بلند کنید.

موقع قرار دادن لگن زیر بیمار ابتدا او را به پهلو بخوابانید و از هل دادن و فشار دادن لگن به زیر بیمار خودداری نمایید

زمانی که بیمار به پهلو خوابیده، بالش یا ملحفه کوچکی بین دو ساق پای قرار دهید.

از انجام ماساژ در نواحی قرمز شده پرهیز کنید. زیرا باعث آسیب به بافت‌های عمیق می‌شود.

جهت بهبود جریان خون موضعی، بعد از تغییر وضعیت بیمار، پوست سالم (اطراف محل زخم) را با مواد نرم کننده، به ملایمت ماساژ دهید.