

داروهای بیماران دیالیزی



بخش دیالیز

واحد آموزش سلامت—بازنگری ۱۴۰۰

۵- کلسی تریول

این دارو در درمان کاهش سطح کلسیم خون استفاده می‌شود.

دوز دارو در بیماران دیالیزی بر اساس میزان کلسیم و فسفر خون تنظیم می‌شود. در صورت نیاز بعد از هر همودیالیز و یا روزانه تجویز می‌شود.

عوارض:

سردرد، بی خوابی، ضعف، تهوع، یبوست، بی اشتها

نکات قابل توجه:

دارو را می‌توان همراه غذا یا با معده خالی میل کرد.

دارو در ظرف مقاوم به نور و جای خشک و خنک نگهداری کنید.

از شکستن و یا خرد کردن و یا جویدن دارو خودداری کنید.

در مصرف غذاهای غنی از کلسیم فسفات و ویتامین دی مثل لبنیات احتیاط کنید.

ارتباط با ما و پاسخگویی به سوالات :

۰۵۱-۵۷۲۳۶۸۳۵

داخلی بخش دیالیز ۱۶۲۸

دسترسی به سایت بیمارستان و استفاده از مطالب آموزشی:

Www.bohlool.gmu.ac.ir

آموزش سلامت

۴- رناژل

این دارو یک فسفر باندر (به فسفر مواد غذایی متصل می‌گردد) ترکیب یا باند شدن با فسفر باعث دفع آن از طریق دستگاه گوارش می‌شود و مانع جذب فسفر می‌شود.

عوارض:

عوارض جانبی رناژل و کربنات کلسیم تقریباً شبیه هم بوده ولی در رناژل عوارض گوارشی مثل یبوست که یکی از مشکلات بیماران دیالیزی است، کمتر دیده می‌شود.

نکات قابل توجه:

۱ - باید مصرف مواد خوراکی حاوی فسفر نظریر آجیل و لبنیات (ماست، شیر، دوغ، کشک...) کاهش یابد.

۲ - در صورت مصرف رناژل هیچ گونه فسفات باندر دیگری را نباید مصرف کنید.

۳ - فاصله مصرف رناژل با داروهای ضد تشنج، وارفارین و سیپروفلوکسازین باید حداقل ۱-۳ ساعت باشد.

۱- اپرکس (اریتروپویتین)

اکثر بیماران مبتلا به نارسایی کلیه که به مدت طولانی دچار اختلال عملکرد کلیه هستند، مبتلا به کم خونی می‌شوند.

کم خونی به دلیل کاهش ترشح هورمون اریتروپوئتین است که ۹۰ درصد آن در غده فوق کلیه ساخته و ترشح می‌شود و با تأثیر بر مغز استخوان باعث افزایش تولید گلبول های قرمز خون می‌گردد. این دارو جهت جبران و اصلاح کم خونی ایجاد شده مورد استفاده می‌گیرد.

عوارض دارو:

صرف بیش از اندازه اپرکس می‌تواند موجب از کار افتادگی فیستول گردد. بنابراین از تزریق خودسرانه و یا تغییر دوز آن اجتناب کنید. تزریق اپرکس باعث افزایش فشار خون شده که در نتیجه از تزریق آن در زمانی که فشار خون بالای ۱۶۰ میلی متر جیوه است باید خودداری شود.

نحوه مصرف اپرکس:

به دو صورت تزریق داخل وریدی و زیر جلدی قابل استفاده می‌باشد.

نکات قابل توجه هنگام مصرف اپرکس:

۱- این دارو باید در درجه حرارت ۸-۲ درجه سانتیگراد نگهداری و از بخ زدگی آن جلوگیری شود.

۳- کربنات کلسیم

این دارو به صورت مکمل غذایی هنگامی که دریافت کلسیم ممکن است ناکافی باشد مصرف می‌شود. همچنین در نارسایی کلیه به دلیل افزایش فسفر خون، این دارو استفاده می‌شود زیرا این دارو در دستگاه گوارش به فسفات متصل می‌شود و مانع جذب آن می‌گردد.

عوارض:

یبوست، تهوع، تشنجی و پر ادراری از عوارض این دارو است.

نکات قابل توجه:

۱- در صورت بروز علایمی نظیر بی اشتها، تکرار ادرار، خشکی دهان، گیجی و هذیان که نشان دهنده افزایش بیش از حد کلسیم در بدن است، باید سریعاً به پزشک خود مراجعه کنید.

۲- اگر هدف از درمان اصلاح کلسیم است باید دارو را یک ساعت بعد از غذا و با یک لیوان پر از آب میل کنید.

۳- اگر هدف اصلاح فسفر است، دارو باید وسط غذا میل شود.

۴- آنتی بیوتیک ها و آهن جذب خوراکی کلسیم را مختل می‌کنند، به همین دلیل با فاصله زمانی از هم مصرف شود.

۲- رنگ محلول باید شفاف باشد.

۳- باید از مخلوط کردن آن با سایر داروها و رقیق کردن آن خودداری کرد.

۴- دارو در یخچال نگهداری شود و از بخ زدگی و تابش مستقیم نور خورشید محافظت شود.

۲- نوفر

این دارو از ترکیبات آهن و ضد کم خونی می‌باشد.

عوارض داروی نوفر :

افت فشار خون (در صورت تزریق سریع)، تغییر موقت حس چشایی، تهوع، ایجاد شوک و احساس طعم فلز در دهان می‌باشد.

نحوه مصرف نوفر:

تزریق وریدی بهترین روش تزریق نوفر می‌باشد. که توصیه می‌شود هر میلی لیتر آن در ۲۰ میلی لیتر سرم نرمال سالین رقیق شود.

نکات قابل توجه:

۱- نوفر نیازی به نگهداری در یخچال ندارد.

۲- نوفر با هیچ دارویی نباید مخلوط شود.

۳- داروی رقیق نشده، داخل رگ سریع تزریق نشود.

۴- در زمان تجویز، قرص آهن قطع شود.