

مراجعه کننده گرامی: در زمان تعیین شده جهت امور پذیرش در مرکز حضور بهم رسانید. با سعه صدر و آرامش خود ما را در ارائه خدمات بهتر یاری فرمایید.

□ آمادگی تصویربرداری از کلیه و مجاری اداری با ماده حاجب

- ◆ نصب آنژیوکت جهت تزریق دارو
- ◆ باردار نبودن
- ◆ شب قبل در ساعت ۱۸ سوپ سبک میل کنید و سپس ملین روغن کرچک و دایمتیکون را طبق دستور پزشک مصرف نمایید.
- ◆ مصرف ملین (روغن کرچک و دایمتیکون) از شب قبل جهت تخلیه روده ها می باشد.
- ◆ تا ساعت ۲۴ آب و مایعات (ترجیحاً مایعات گرم) فراوان نوشیده شود (به جز شیر و نوشابه).
- ◆ ناشتا بودن به مدت ۶ تا ۸ ساعت و همراه داشتن آزمایش *BUN* و *Cr*
- ◆ نداشتن بیماری دیابت و تیروئید و حساسیت به ماده حاجب
- ◆ داروهای خود را طبق برنامه همیشگیتان مصرف کنید؛ البته به جز متفورمین و ایندرال (قطع این داروها از ۴۸ ساعت قبل از انجام آزمون الزامی است و مصرف دوباره قرص متفورمین به شرط عملکرد طبیعی کلیه ها پس از انجام آزمون با تزریق ماده حاجب بلامانع است.) (مصرف مجدد قرص ایندرال بعد از آزمون آزاد است).
- ◆ توجه به این نکته ضروری است در صورتی که درخواست اورژانس گرافیهای فوق الذکر باشد، نیاز به دادن آمادگی به بیمار نیست.

□ عکسبرداری جهت بررسی برگشت ادرار از مثانه به حالت:

- سوند ادراری نصب می شود
- باردار نبودن و نداشتن حساسیت به ماده حاجب
- همراه داشتن مدارک قبلی
- پوشیدن لباس ساده و راحت بدون زیپ و گیره و..
- نیاز به آمادگی روده ای و ناشتایی نیست