

آندوسکوپی فوقانی

ویژه بیماران و همراهیان



کارگروه آموزش به بیمار بخش داخلی

کد سند Bh-Mn/Pat Edu Pam//doc-04/05

بازنگری: ۱۴۰۳

دفعات بازنگری: ۵

Www.bohlool.gmu.ac.ir

شما نیاز به مراقبت پزشکی فوری دارید در صورتی که علایم زیر را داشته باشید:

- بروز تب
- استفراغ خونی یا استفراغی که به نظر می‌رسد قهوه‌ای باشد.
- مدفوع خونی سیاه رنگ و یا قیری رنگ
- گلودرد شدید یا نداشتن توان بلع غذا
- تنفس سخت

منبع:

<https://www.mayoclinic.org>

شماره تماس: ۰۵۱۵۷۲۳۶۸۳۴

داخلی ۱۱۶۶—۱۱۸۸

آدرس وبسایت: Www.bohlool.gmu.ac.ir



جهت دریافت فایل، بارکد را با
تلفن همراه خود اسکن نمایید.

بعد انجام آندوسکوپی

- به علت دریافت آرام بخش تا ۲۴ ساعت رانندگی نکنید.
- تا زمانی که اثر داروهایی که دریافت کرده اید از بین نرود، فشار خون ضربان قلب، تنفس و سطح اکسیژن خون شما بررسی می‌شود.
- زمانی که بی‌حسی گلوی شما تمام شود می‌توانید چیزی بخورید.
- از بخش و پزشک معالج در مورد اینکه چه زمانی جواب نمونه آماده است، سوال بپرسید.
- پیگیری نمونه پاتولوژی را نیز در تاریخ مشخص شده انجام دهید.

شما نیاز به مراقبت پزشکی دارید اگر:

- گلودرد بیشتر از یک روز طول بکشد
- بلع مشکل داشتید

آندوسکوپی فوقانی

آندوسکوپی فوقانی روشنی است که از آن جهت مشاهده بخش فوقانی دستگاه گوارش و همچنین جهت پیدا کردن علت مشکلات دیگر مانند:

- درد معده
- سوزش سردل
- درد یا مشکل هنگام بلع
- علت تهوع واستفراغ
- خونریزی از معده
- زخم معده
- آندوسکوپی را انجام دهد.

قبل انجام آندوسکوپی شما باید موارد زیر را بدانید و اطلاع دهید:

- ♦ هر گونه آلرژی یا حساسیت به داروی خاص
- ♦ هر گونه دارویی که مصرف می کنید:
شامل ویتامین ها ، قطره های چشمی ، و یا هر دارویی که بدون نسخه پزشک استفاده می کنید و یا مصرف آسپرین و وارفارین
- ♦ هر گونه اختلال خونی که داردید.
- ♦ هرگونه جراحی قبلی که داشتید.
- ♦ هر مشکل پزشکی قبلی
- ♦ بارداری

آمادگی قبل انجام آندوسکوپی

- دستور پزشک مربوط به نخوردن مواد غذایی را رعایت کنید که معمولاً از ۶ ساعت قبل از آندوسکوپی باید کاملاً ناشتا باشید.
- از پزشک خود درمورد توقف یا ادامه مصرف داروهایی که مرتب مصرف می کنید سوال کنید؛ در صورتی که داروی رقیق کنند خون مصرف می کنید این موضوع اهمیت بیشتری دارد.
- همراهی داشته باشید.

روش انجام آندوسکوپی

- یک راه وریدی جهت تزریق دارو برای شما تعییه می شود.
- اسپری بی حس کننده موضعی در حلق شما زده می شود.
- جهت آرام کردن شما ممکن است از آرام بخش استفاده شود.
- شما به پهلوی چپ می خوابید.
- پزشک شما لوله ای آندوسکوپ را از دهان شما عبور می دهد و از طریق مری پایین می برد.
- پزشک از اسکوپ جهت بررسی داخل مری و معده و دوازدهه شما استفاده می کند و نمونه نیز ممکن است گرفته شود.

پزشک ممکن است جهت تشخیص سرطان بخش فوقانی دستگاه گوارش و همچنین جهت پیدا کردن علت مشکلات دیگر مانند:

در این روش پزشک شما یک لوله باریک و قابل انعطاف را از طریق دهان تان عبور می دهد و از مری به معده داخل می شود.

یک دوربین کوچک به انتهای لوله چسبیده است عکس ها با دوربین بر روی مانیتوری که در داخل اتاق آندوسکوپی نصب شده است نمایش داده می شود.

در طی انجام آندوسکوپی ، پزشک ممکن است تکه هایی از بافت را جهت فرستادن به آزمایشگاه و بررسی میکروسکوپی بافت شما نمونه برداری کند و در ظرف مخصوص جهت ارسال به پاتولوژی قرار دهد.

خطرات و عوارض آندوسکوپی چیست؟

به طور کلی این روش بی خططی باشد با این حال مشکلاتی ممکن است رخداد از جمله:

⇒ واکنش حساسیتی به داروها

⇒ سوراخ یا پارگی درمری ، معده یا روده

⇒ عفونت

⇒ خونریزی

⇒

