



Bohlool Hospital

تزریق خون و فرآورده های خونی

ویژه بیماران و همراهیان



کارگروه آموزش به بیمار بخش داخلی

کد سند Bh-Mn/Pat Edu Pam//doc-04/05

بازنگری : ۱۴۰۳

دفعات بازنگری: ۵

Www.bohlool.gmu.ac.ir

علایم و عوارض ناخواسته ناشی از تزریق خون و فرآورده های خونی عبارتند از :

- == لرز
- == تب ناگهانی یا احساس سرما
- == خارش بدن
- == لکه های قرمزرنگ روی پوست (کهیر)
- == گرگرفتگی
- == تهوع یا استفراغ
- == درد در محل تزریق
- == درد قفسه سینه
- == شکم و عضلات
- == درد در قسمت پایین پشت (کمر)
- == احساس ناخوشی عمومی
- == تنگی نفس و سرفه
- == تند تند نفس کشیدن
- == ادرار تیره
- == اضطراب

عوارض تزریق خون می تواند بلافاصله بعد از شروع تزریق تا ۲۴ ساعت پس از پایان تزریق رخ دهد.

با مشاهده هر یک از این علایم سریعاً "به پرستار مراقب خود اطلاع دهید.

شماره تماس: ۰۵۱۷۷۲۳۶۸۳۴

داخلی ۱۱۸۸—۱۱۶۶



trans

جهت دریافت فایل، بارکد را با
تلفن همراه خود اسکن نمایید.

- == در حین تزریق، اندازه گیری ضربان قلب، فشار خون و حرارت بدن بطور مرتبت انجام خواهد شد.
- == ۱۵ دقیقه اول تزریق فرآورده های خونی بسیار مهم است و امکان ایجاد حساسیت و واکنش بیشتر است، بنابراین به هیچ عنوان بیمار خود را تنها نگذارید.
- == علائم و نشانه های حساسیت را به پرستار باید بلافاصله اطلاع دهید.
- == مدت زمان تزریق کیسه خون متفاوت است ، که پرستار در این خصوص به شما توضیح خواهد داد.
- == بیشتر افراد در زمان تزریق خون احساس متفاوتی ندارند.
- == ولی اگر شما به دلیلی احساس می کنید که حالتان خوب نیست به پرستار اطلاع دهید.

در مورد نوزادان و کودکان:

- * در صورت تب دار بودن نوزاد و کودک قبل از تزریق ، پرستار و پزشک را در جریان بگذارید.
- * در صورت فلیت و یا مشکوک و یا مشکوک بودن رگ ، رگ جدید گرفته شود.
- * در صورتی که نوزاد از قبل مبتلا به بیماری قلب و ریه باشد، حتما به پزشک اطلاع دهید.
- * در حین تزریق، تغذیه نوزاد بلامانع است.

اگر نیاز به تزریق خون داشته باشید گروه خونی شما باید مشخص شود و از موجود بودن نوع خون شما اطمینان حاصل شود. هنگامی که خون شما آزمایش می‌گردد، شما باید کمک کنید که بررسی شود تا تمامی جزئیات مندرج در فرم و لوله دقیقاً مطابق هم باشند که این شامل درست بودن تاریخ تولد و نام و نام خانوادگی شما شما نیز می‌شود.

رایج ترین خطرات یک تزریق خون عبارتند از:

- * عوارض جزئی مانند تب خفیف، یا جوش ریز پوست
- * ازدیاد مایعات بدن، که باعث مشکلات تنفسی گشته، بویژه در افراد سالمند و کسانی که دچار بیماری قلبی هستند.

سایر خطرات تزریق که کمتر رایج است عبارتند از :

- * دریافت خونی که مطابق با شما نباشد
- * عوارض شدید، مانند، حساسیت یا آسیب شدید ریه‌ای
- * انتقال عفونت، مانند، باکتری یا ویروس‌ها

قبل از تزریق خون و فرآورده‌های خونی از بیمار رضایت گرفته می‌شود.



پلاسمای خون

پلاسما دارای عواملی است که با همکاری با پلاکت‌ها به انعقاد خون کمک می‌کند و به فرد داده می‌شود تا از خونریزی پیش‌گیری کند یا باعث توقف آن شود.



پلاکت‌ها:

پلاکتها به انعقاد خون کمک می‌کنند و به شما داده می‌شود تا از خونریزی پیش‌گیری کند یا موجب توقف آن شود.



تزریق خون روشنی است که طی آن شما از راه یک لوله وریدی که به رگ وارد می‌شود، خون دریافت می‌کنید. اگر بدن شما نتواند بخش‌هایی از خون شما را بسازد، اگر سلولهای خونی شما به درستی کار نکنند، یا اگر شما خون از دست داده باشید، ممکن است که به تزریق خون نیاز پیدا کنید.

قسمت‌هایی از خون که ممکن است مورد نیاز باشند:

گلbulول‌های قرمز

گلbulول‌های قرمز، اکسیژن را به بافت‌ها و اعضای داخلی بدن می‌رسانند.

هنگامی که میزانشان در خونتان پایین باشد، یا زمانی که خون از دست داده باشید به شما داده می‌شوند.

