




Bohlool Hospital

## تعویض مفصل زانو

ویژه بیماران و مراجعین



### کارگروه آموزش به بیمار بخش ICU

کد سند: Bh-Mn / pat edu pam / doc-04 / 05

بازنگری: ۱۴۰۳

دفعات بازنگری: ۵

[www.bohlool.gmu.ac.ir](http://www.bohlool.gmu.ac.ir)

## مواردی که لازم است با پزشک خود در میان بگذارید:

- => گرمی قرمزی و ورم شدید و ترشح از محل بخیه ها
- => مشکلات تنفسی و درد قفسه سینه
- => افزایش درد زانوی عمل شده
- => حالت سر گیجه و گیجی
- => تب بیشتر از ۳۸ درجه
- => خونریزی غیرعادی از بدن

[www.mayoclinic.org](http://www.mayoclinic.org)

آدرس وبسایت :

[www.Bohlool.gmu.ac.ir](http://www.Bohlool.gmu.ac.ir)



برای دریافت فایل می توانید

بارکد روپرتو را با تلفن همراه

اسکن نمایید.

## فیزیوتراپی بعد از عمل

انجام فیزیوتراپی بعد از انجام جراحی جزء مهم ترین قسمت هایی است که با استفاده از جراحی برای مدت زمان مشخصی انجام دهید؛ دقیق داشته باشد که با انجام فیزیوتراپی می توانید به تقویت عضلات زانو کمک کنید، از همه مهم تر این کار به بهبود محدودیت های حرکتی هم کمک می کند و باعث می شود تا فرد زودتر کارهای روزانه خود را انجام دهد.

## مواردی که باید از انجام آن خودداری کنید:

- \* نشستن و خوابیدن روی زمین
- \* چهار زانو و دوزانو نشستن
- \* استفاده از توالات ایرانی
- \* بالا و پایین رفتن زیاد از پله
- \* چرخش ناگهانی زانو
- \* ورزش های سنگین



## مراقبت از زخم جراحی:

- \* پس از عمل روی قسمت جراحی شده پانسمان قرار خواهد گرفت. تا زمانی که پزشک به شما اجازه باز کردن نمی دهد، باید آن را کاملاً خشک و تمیز نگهدارید.
- \* تعویض پانسمان ناحیه عمل، حتماً طبق دستور جراح در منزل توسط فردی با تجربه و ماهر باید ادامه داشته باشد.
- \* استحمام با نظر پزشک شروع می شود در این خصوص باید از پزشک خود پیروی کنید.
- \* در صورت وجود ترشح بد بو روی پانسمان، افزایش درد، تورم، قرمزی و تب به پزشک مراجعه کنید.

## داروهای بعد از عمل جراحی در منزل:

- \* برای پیشگیری از لخته شدن خون تا دو هفته بعد از جراحی نیاز به داروی ضد انعقاد(تزریقی یا خوراکی) است.
- \* درمان با آنتی بیوتیک خوراکی و مسکن در منزل لازم است.
- \* در صورتی که دیابت و فشارخون دارید طبق روال قبل داروهای خود را مصرف نمایید



## راه رفتن و فعالیت بعد از عمل:

⇒ بلافضلله بعد از به هوش آمدن یا از بین رفتن بی حسی پاهای، می توانید انقباض عضلات ران و ساق پا را شروع کنید.

⇒ زیر مج پای عمل شده یک بالش قرار می گیرد.  
⇒ پوشیدن جوراب واریس به پای سالم، قبل و بعد از عمل برای جلوگیری از تشکیل لخته در پا ضروری است.

⇒ تا ۴۸ ساعت بعد از عمل از آتل مخصوص جراحی زانو، جهت صاف نگهداشتن پا استفاده می شود.

⇒ راه رفتن از دور روز بعد از جراحی با کمک فیزیوتراپ و پرستار شروع می شود. بیمار با عصایا و اکر راه می رود.  
⇒ هفته اول بعد از عمل باید از واکر استفاده کنید و با زانوی خم راه نروید؛ پای خود را روی زمین نکشید یک پا را بلند کرده و جلو بگذارید.

⇒ از هفته دوم از یک عصای معمولی استفاده کنید و آن را در سمتی که زانوی شما عمل نشده در دست بگیرید.

⇒ بعد از گذشت یک ماه و نیم از عمل اگر پای دیگر شما مشکل نداشته باشد، می توانید بدون عصای راه بروید.  
⇒ از توالات فرنگی استفاده نمایید.



بیمارانی که دچار درد شدید زانو ناشی از آسیب، تصادف، بیماریهای مزمن و یا ساییدگی زانو به دلیل بالارفتن سن یا چاقی هستند و درمانهای معمول برای آنها موثر نیست، تحت عمل تعویض مفصل زانو قرار میگیرند.

قبل از عمل جراحی آزمایشات پزشکی و بررسی لازم برای شما انجام می شود و آمادگی های لازم به شما داده می شود.

## مراقبتهای بعد از عمل جراحی چیست؟

### رژیم غذایی بعد از عمل و در منزل:

⇒ بعد از عمل تا هوشیاری کامل نباید چیزی بخورید و سپس با دستور پزشک و اجازه پرستار بعد از چند ساعت برای شما رژیم مایعات و درصورت نداشتن مشکل، رژیم معمولی شروع خواهد شد.

⇒ بهتر است از مواد غذایی حاوی آهن زیاد (گوشت و جگر) و میوه ها که ویتامین سی دارند، استفاده کنید.  
⇒ آب زیاد بنوشید.

⇒ مراقب باشید اضافه وزن نداشته باشید.  
⇒ مواد لبنی مانند شیر و پنیر و ماست کم چربی که حاوی کلسیم هستند استفاده کنید.

