

خون مخفی در مدفوع

گاهی اوقات خونریزی های مختصری در بخش های مختلف دستگاه گوارش اتفاق می افتد که به علت کم بودن با چشم دیده نمی شود . بنابر این باید با روش های آزمایشگاهی تشخیص داده شود . بهتر است این آزمایش در ۳ نوبت انجام شود. برای انجام این آزمایش باید نکات زیر را رعایت نمائید:

۴۸-۷۲ ساعت پیش از آزمایش و در طی دوره جمع آوری نمونه مدفوع از خوردن گوشت قرمز ؛ گوشت سفید (مرغ و ماکیان) ماهی ، شلغم و تربچه خودداری کنید. مصرف قرص های آهن و فر فولیک ، کپسول هماتینیک و ففول ، ایندومتاسین ، گلشیسین ، اسپیرین ، بروفن ، کورتون ها و ویتامین C باید ۴۸ ساعت پیش از انجام آزمایش قطع شود .

در صورت داشتن سابقه خونریزی از لثه ۴۸ ساعت پیش از انجام آزمایش از مسواک زدن و کشیدن نخ دندان اجتناب نمائید.

نمونه باید سریعاً به آزمایشگاه تحویل داده شود.

نمونه مدفوع نباید با ادرار یا سایر مواد آلوده شود.



تیم کنترل کیفیت آزمایشگاه
بیمارستان علامه بهلول گنابادی