


آندوسکوپی معده



آندوسکوپی فوقانی دستگاه گوارش

آندوسکوپی فوقانی روشی است که از آن جهت مشاهده بخش فوقانی دستگاه گوارش استفاده می شود. آندوسکوپی فوقانی که به اختصار آندوسکوپی نامیده می شود، دیدن مری، معده و دوازدهه بوسیله دستگاه مخصوص می باشد.

در این روش پزشک شما یک لوله باریک و قابل انعطاف را از طریق دهان تان عبور می دهد واز مری به معده داخل می شود. یک دوربین کوچک به انتهای لوله چسبیده است عکس ها با دوربین بر روی مانیتوری که در داخل اتاق آندوسکوپی نصب شده است نمایش داده می شود. در طی انجام آندوسکوپی ، پزشک ممکن است تکه هایی از بافت را جهت فرستادن به آزمایشگاه و بررسی میکروسکوپی بافت شما نمونه برداری کند و در ظرف مخصوص جهت ارسال به پاتولوژی قرار دهد.

خطرات و عوارض آندوسکوپی چیست؟

به طور کلی این روش بی خطر می باشد با این حال مشکلاتی ممکن است رخ دهد از جمله :

- ✓ واکنش حساسیتی به داروها
- ✓ سوراخ یا پارگی در مری ، معده یا روده
- ✓ عفونت
- ✓ خونریزی

پزشک ممکن است جهت تشخیص سرطان بخش فوقانی دستگاه گوارش و همچنین جهت پیدا کردن علت مشکلات دیگر مانند: درد معده، سوزش سردل، درد یا مشکل هنگام بلع، علت تهوع و استفراغ، خونریزی از معده و زخم معده آندوسکوپی را انجام دهد.

قبل انجام آندوسکوپی شما باید موارد زیر را بدانید و اطلاع دهید :

- ✓ هر گونه آلرژی یا حساسیت به داروی خاص
- ✓ هر گونه دارویی که مصرف می کنید: شامل ویتامین ها ، قطره ها ی چشمی ، ویا هر دارویی که بدون نسخه پزشک استفاده می کنید و یا مصرف آسپرین و وارفارین هر گونه اختلال خونی که دارید.
- ✓ هر گونه جراحی قبلی که داشتید.
- ✓ هر مشکل پزشکی قبلی
- ✓ بارداری

آمادگی قبل انجام آندوسکوپی

دستور پزشک مربوط به نخوردن مواد غذایی را رعایت کنید که معمولا از ۶ ساعت قبل از آندوسکوپی باید کاملا ناشتا باشید. از پزشک خود در مورد توقف یا ادامه مصرف داروهایی که مرتب مصرف می کنید، سوال کنید؛ در صورتی که داروی رقیق کنند خون مصرف می کنید این موضوع اهمیت بیشتری دارد. همراهی داشته باشید.

روش انجام آندوسکوپی

۱. یک راه وریدی جهت تزریق دارو برای شما تعبیه می شود.
۲. اسپری بی حس کننده موضعی در حلق شما زده می شود.
۳. جهت آرام کردن شما ممکن است از آرام بخش استفاده شود.
۴. شما به پهلو چپ می خوابید.
۵. پزشک شما لوله ی آندوسکوپ را از دهان شما عبور می دهد واز طریق مری پایین می برد.
۶. پزشک از اسکوپ جهت بررسی داخل مری و معده و دوازدهه شما استفاده می کند و نمونه نیز ممکن است گرفته شود.

بعد انجام آندوسکوپی

- به علت دریافت آرام بخش تا ۲۴ ساعت رانندگی نکنید.
- تا زمانی که اثر داروهایی که دریافت کرده اید از بین نرود، فشار خون ضربان قلب، تنفس و سطح اکسیژن خون شما بررسی می شود.
- زمانی که بی حسی گلوئی شما تمام شود می توانید چیزی بخورید.
- از بخش و پزشک معالج در مورد اینکه چه زمانی جواب نمونه آماده است، سوال بپرسید .
- پیگیری نمونه پاتولوژی را نیز در تاریخ مشخص شده انجام دهید.

شما نیاز به مراقبت پزشکی دارید اگر: گلودرد بیش تر از یک روز طول بکشد یا بلع مشکل داشتید

شما نیاز به مراقبت پزشکی فوری دارید در صورتی که علائم زیر را داشته باشید:

- ✓ بروز تب
- ✓ استفراغ خونی یا استفراغی که به نظر می رسد قهوه ای باشد.
- ✓ مدفوع خونی سیاه رنگ و یا قیری رنگ
- ✓ گلودرد شدید یا نداشتن توان بلع غذا
- ✓ تنفس سخت