


مراقبت از سوند ادراری



کارگروه آموزش به بیمار بخش داخلی
واحد آموزش سلامت—بازنگری سوم

به زمان خارج کردن سوند که توسط پزشک معالج شما تعیین می گردد، توجه نموده و جهت انجام آن در تاریخ مقرر به درمانگاه مراجعه نمایید.

چه زمانی باید به پرستار یا پزشک اطلاع داده و به آنها مراجعه نمود؟

- زمانی که ادرار درون کیسه ادراری، خونی، کدر و یا بدبو شود.
- هیچ ادراری درون کیسه ادراری جمع نشود و یا خیلی کم جمع شود و یا نشت ادرار داشته باشد.
- در صورت درد، تب و لرز، زمانی که بدون علت خاصی دمای بدن بیمار ۳۸ و یا بالاتر از ۳۸ شد.

- با آرزوی سلامتی

ارتباط با ما و پاسخگویی به سوالات:
تلفن: ۰۵۱۵۷۲۳۶۸۳۵ - داخلی: ۱۶۰۰

آدرس سایت بیمارستان: [Www.bohlool.gmu.ac.ir](http://www.bohlool.gmu.ac.ir)


<https://www.mayoclinic.org/>

از کشیدن یا جدا کردن لوله تخلیه ادرار خودداری نمایید زیرا باعث خونریزی یا ضربه به مجرما می شود. این کار را به پرسنل مجرب بسپارید.

هنگام راه رفتن، لوله تخلیه ادرار را در دست خود حلقه کنید و پایین تر از سطح مثانه نگه دارید. یا از سمت داخل با استفاده از چسب سوند را به پای خود ثابت کنید.


پوست اطراف سوند را حداقل دو مرتبه در طی روز با آب سرد و صابون بشویید تا هر گونه ترشحات و نشت ادرار تمیز شود سپس محل را کاملاً خشک نمایید.

همیشه دستهایتان را قبل و بعد از مراقبت از سوند بشویید. جهت جلوگیری از کشیده شدن سوند آن را به خود بچسبانید.




جهت پیشگیری از برگشت ادرار و احتمال عفونت، کیسه ادرار را پایین تر از سطح مثانه خود قرار دهید.

هرگز کیسه ادرار را روی شکم خود قرار ندهید.



در حالت خوابیده



در حالت ایستاده

جهت پیشگیری از آلدگی، از جدا کردن لوله ادرار از کیسه ادرار جدا خودداری کنید.

اگر تصادفاً سوند شما خارج شد یا نشت ادرار داشت جهت جایگزینی مجدد سوند، خودتان هیچ اقدامی انجام ندهید و حتماً به یک مرکز درمانی مراجعه نمایید.

به منظور کاهش خطر عفونت، کیسه ادرار را هر ۸ ساعت یک بار تخلیه نمایید.



اگر ظرف ۸-۶ ساعت، ادرار به داخل کیسه جریان نیافت و مطمئن شدید که سوند شما پیچ خورده‌گی نداشته و یا خم نشده است به مرکز درمانی مراجعه نمایید.

بیمار عزیز حال که نیازمند به داشتن سوند ادراری مثانه هستید لازم است به نکات زیر توجه فرمایید: جای گذاری سوند ادراری در بیماران برای مقاصد تشخیصی و درمانی انجام می‌گردد.

در جنبه درمانی می‌توان از سوند برای تخلیه مثانه در بیماران دچار احتباس ادراری حد یا مزمن که در نتیجه بند آمدن مجرای ادراری ایجاد می‌شود، استفاده نمود.

در بیماران مبتلا به هماچوری (وجود خون در ادرار) ممکن است سوند گذاری و سپس شستشو برای خارج کردن خون و لخته‌ها از مثانه لازم گردد.

در بیمارانی که بنا به تشخیص پزشک لازم است سوند مثانه تا زمانی حفظ شود رعایت نکات زیر توصیه می‌شود:

جهت جلوگیری از عفونت، مایعات فراوان بنوشید(در صورتی که از طرف پزشک معالج محدودیت مایعات نداشته باشد).

