

نوع جراحی	آنتی بیوتیک پیشنهادی
قلبی: بای پس کرونری قراردادن ابزار قلبی (مثل پیس میکر) جایگزاری ابزار کمکی بطن	سفازولین - سفوروکسیم
جراحی قفسه سینه	سفازولین
گاستروئودونال (موارد وارد شدن به لومن یا بدون ورود به لومن در گروههای باریک بالا)	سفازولین
صفاوی جراحی باز یا لاپاروسکوپی	سفازولین - سفتریاکسون سفوگسیترین
آپاندکتومی	سفازولین + مترونیدازول
کولورکتال	سفتریاکسون + مترونیدازول
نوروسرجری	سفازولین (+ وانکومايسين)
سزارین	سفازولین
هیسترکتومی	سفازولین
ارتوپدی	سفازولین
ارولوژیک استفاده از ابزار مجاری تحتانی (بیوپسی پروستات ترنس رکتال) سایر موارد (clean procedure) موارد (clean- contaminated)	فلوروکینولون - سفازولین سفازولین + آمینو گلیکوزید (تک دوز در جایگزین مواد مصنوعی) سفازولین + مترونیدازول
عروقی	سفازولین

از اندیکاسیون های شروع ونکومايسين بعنوان پروفیلاکسی جراحی: 1- جراحی تعبیه دریچه مصنوعی یا گرافت عروقی 2- سابقه کلونیزاسیون قبلی 3- بستری شدن بیش از 3 روز در بیمارستان قبل عمل جراحی 4- در موارد جراحی های با زخم کثیف و آلوده بر اساس وضعیت بیمار و وجود عفونت همزمان، آنتی بیوتیک مناسب بر اساس نظر پزشک تجویز شود.