Bohlool Hospital

# چک لیست ارزیابی احیا نوزاد (NRP)

تاریخ ارزیابی: نام بخش: نام ارزیاب: فرد مورد ارزیابی:

| ردیف | مراحل انجام کار | | قابل قبول | نیاز به آموزش | شامل نمی شود |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سن بارداری | بررسی ۴ پرسش اولیه | | | |
| 2 | برنامه مدیریت بند ناف | | | | |
| 3 | شفافیت مایع آمنیوتیک | | | | |
| 4 | بررسی شرایط پر خطر | | | | |
| 5 | وارمر، حوله و پتوی گرم | آماده سازی وسایل | | | |
| 6 | کیسه پلی اتیلن برای کمتر از ۳۲ هفته | | | | |
| 7 | پوار و کاتتر ساکشن F/12F۱۰ | | | | |
| 8 | گوشی پزشکی | | | | |
| 9 | پالس اکسیمتر | | | | |
| 10 | لارنژیال ماسک و لارنگوسکوپ با تیغه ۰،۰،۱ | | | | |
| 11 | ماسک و آمبوبگ مناسب | | | | |
| 12 | بلندر و T-piece | | | | |
| 13 | تنظیم PEEP=5 و PIP=25 و FLOW O2=10 | | | | |
| 14 | سوند معده | | | | |
| 15 | کاتتر نافی، ست پانسمان، قیچی و چسب | | | | |
| 16 | سرم نرمال سالین و اپی نفرین ۱:۱۰۰۰۰ با سرنگ ۵ و ۱۰ | | | | |
| 17 | بررسی ترم | ارزیابی نوزاد | | | |
| 18 | بررسی تون | | | | |
| 19 | بررسی تنفس | | | | |
| 20 | بررسی نیاز به PPV | بررسی تنفس | | | |
| 21 | زیر ۳۲ هفته PIP بین ۲۰-۲۵ و Fio2=30% | | | | |
| 22 | بالای ۳۲ هفته PIP بین ۲۵-۳۰ و Fio2=21 | | | | |
| 23 | بررسی راه هوایی و ساکشن قبل PPV | | | | |
| 24 | دیسترس=CPAP | | | | |
| 25 | آپنه یا HR<۱۰۰ = تهویه فشار مثبت | | | | |
| 26 | تهویه تا ۳۰ ثانیه و چک همزمان ضربان قلب | | | | |
| 27 | 60<HR<100 = MR SOPA | بررسی ضربان قلب | | | |
| 28 | HR<60 = intubation & ventilation **for 30s** | | | | |
| 29 | HR<60 = CPR **for 60s** | | | | |
| 30 | HR<60 = epinephrine 0.2 cc/kg | | | | |
| 31 | N/S 3cc | | | | |
| 32 | محل مناسب دست ها و نحوه ماساژ | ماساژ | | | |
| 33 | رعایت نسبت ۳:۱ | | | | |
| 34 | عمق ماساژ | | | | |