




Bohlool Hospital

ختنه و باز کردن مجرا

رئ از تنگی مجاری ادراری



کارگروه آموزش به بیمار بخش جراحی ۲

واحد آموزش سلامت — بازنگری سوم

◀ در صورت داشتن سوند، سوندها باید تمیز باشند و هیچ گونه ترشحاتی به آنها نچسبیده باشد.

◀ استفاده از پماد آنتی بیوتیک دوبار در روز به مدت یک هفته و یک بار در روز به مدت دو هفته بعد

◀ در دفعات اول ادرار کردن احساس سوزش وجود دارد که تا ۱-۲ روز بعد به تدریج برطرف می شود.

در صورت بروز این علائم به پزشک مراجعه کنید:

- کاهش فشار ادرار
- باریک شدن جریان ادرار
- خون زیاد در ادرار
- قطع و وصل شدن ادرار
- سوزش ادرار و تکرر ادرار
- عدم تخلیه کامل ادرار
- تب و ترشح چرکی از مجرا

آدرس وبسایت :

www.Bohlool.gmu.ac.ir

تلفن: ۰۵۱۵۷۲۳۶۸۳۵

بخش جراحی ۲: ۱۷۷۷



جهت دریافت فایل می توانید بارکد را با

تلفن همراهتان اسکن نمایید.

علل تنگی مجرا :

- ترمیم ناموفق هیپواسپایدیس
- ضربه
- سوندگذاری طولانی مدت
- بعد از ختنه
- شکستگی لگن به علت تصادف
- اشعه درمانی به ناحیه لگن
- جراحی پروستات

◀ **مراقبتهای بعد از عمل :**

◀ برای جلوگیری از یبوست (شکم سفت کار می کند) به دلیل استراحت زیاد ، خوردن مایعات و غذاهای فیبردار (مثل هویج ، کاهو ، سبزیجات و ...) توصیه می شود.

◀ مصرف مایعات زیاد بخصوص آب تا جایی که رنگ ادرار بیرنگ و سفید شود به پیشگیری از عفونت و به باز نگه داشتن مجاری کمک می کند.

◀ توجه کنید که رنگ ادرار نباید زرد پررنگ باشد، اگر ادرار بیمار کم بود یا تغییری در ادرار کردن مشاهده نمودید به پزشک یا پرستار اطلاع دهید.

◀ بهداشت ناحیه عمل بسیار مهم است. لذا شست و شوی روزانه ی محل عمل بسیار مهم است.

ختنه:

نوعی عمل جراحی است که در آن پوست روی ختنه گاه برداشته می‌شود.

ختنه به دو روش جراحی و استفاده از حلقه انجام می‌شود.

مراقبتهای بعد از عمل ختنه به روش جراحی:

← برای برداشتن پانسمان بعد از سه روز کودک را در لگن آب ولرم به مدت ۱۵ دقیقه نشانده تا پانسمان جدا شود در صورتیکه جدا نشد این کار را دوباره تکرار کنید.

← محل برش در ابتدا قرمز و متورم و حساس بوده که بتدریج بهبود می‌یابد.

← نوک مجرا را با پماد تتراسیکلین روزی دو مرتبه چرب نمایید.

← بخیه‌ها جذبی می‌باشد و به مدت ۷-۱۰ روز بعد خودش خواهد افتاد و نیازی به کشیدن نمی‌باشد.

← تا ۳ روز نباید کودک را به حمام برد.

← در صورت استفاده از پوشک آن را شل ببندید و بهتر است از یک سایز بزرگتر استفاده نمایید.

← چرک خشک کن تجویز شده توسط پزشک را طبق دستور مصرف نمایید.

← برای کنترل درد کودکان می‌توانید شربت، شیاف، قطره استامینوفن هر ۴ ساعت استفاده نمایید.

← در ختنه به روش حلقه یک هفته بعد باید به پزشک مراجعه نمایید.

← معمولاً بعد از یک هفته حلقه می‌افتد.

← حتماً قبل از ترک بیمارستان نوزاد شما یک بار ادرار کرده باشد.

در صورت بروز علائم زیر به پزشک مراجعه نمایید:

← تب ولرز

← قطره قطره ادرار کردن

← خونریزی از محل ختنه به صورت چکه چکه کردن

← تورم شدید و خروج چرک از محل ختنه

← در صورتیکه نوزاد به روش حلقه ختنه شده باشد، اگر بعد

از یک هفته حلقه نیفتاد یا در صورت خونریزی یا تورم و

درد شدید یا بی‌حالی نوزاد یا عدم دفع ادرار بعد از ۲۴

ساعت باید فوراً به پزشک مراجعه نمایید.

مآتومی (ترمیم مجرای ادرار):

مجرا یک تیوب (لوله) است که ادرار را از مثانه به خارج هدایت می‌کند.

تنگی مجرا یک حالت و وضعیت پزشکی است که اساساً مردان را مبتلا می‌کند.

چه عواملی باعث تنگی مجرا می‌شوند؟

تنگی مجرا باعث می‌شود که ادرار خوب تخلیه نشود، این حالت معمولاً به علت التهاب بافت مجرا و ایجاد بافت غیر طبیعی در مجرا به نام اسکار می‌ماند.

بافت اسکار می‌تواند به علت های متعددی بوجود آید.

بچه‌هایی که جراحی برای عمل هیپوسپادیا (مجرا در محل غیر طبیعی) داشته‌اند و مردانی که سابقه عمل جراحی اورولوژی یا سونداژ داشته‌اند، شانس ابتلا به تنگی مجرا را خواهند داشت.

کسانی که از ارتفاع بلند می‌افتند، در معرض تنگی مجرا هستند. از مثال‌های فوق می‌توان از روی زین اسب افتادن یا ضربه به زیر کیسه بیضه (اسکروتوم) را نام برد.

تنگی مجرا باعث علائم متعددی می‌شود:

بعضی علائم تنگی مجرا شامل:

کاهش فشار ادرار یا کاهش حجم ادرار

بطور ناگهانی برای ادرار کردن به توالت رفتن

درد یا سوزش موقع ادرار کردن

درد در ناحیه لگن یا پایین شکم

ترشح مجرا

تورم و درد آلت

وجود خون در منی یا ادرار

عدم توانایی در ادرار کردن