




Bohlool Hospital

## شکستگی لگن



کارگروه آموزش به بیمار بخش جراحی ۲

واحد آموزش سلامت — بازنگری اول

در صورت بروز علائم زیر پس از عمل فوراً به پزشک مراجعه کنید:

◀ تب بالاتر از ۳۸

◀ خونریزی یا ترشح زیاد از محل جراحی

◀ در صورت تورم و درد غیرقابل کنترل

◀ سردی و رنگ پریدگی و بی حسی اندام

◀ در صورت داشتن علائم عفونت از جمله تب، لرز، قرمزی و خروج ترشح چرکی از ناحیه عمل شده و حساسیت در لمس به پزشک مراجعه کنید.

در روز مشخص شده حتماً به پزشک جراح مراجعه کنید.

برونر سودارث ارتوپدی

آدرس وبسایت :

[www.Bohlool.gmu.ac.ir](http://www.Bohlool.gmu.ac.ir)

شماره تماس: ۵۷۲۳۶۸۳۳-۵۱-شماره داخلی ۱۷۷۷



جهت دریافت محتوای

پمفلت، بارکد را با تلفن

همراه خود اسکن نمایید .

باید از غذاهای حاوی پروتئین و کلسیم کافی برای کمک به جوش خوردن شکستگی کمک گرفت.

لبنیات مهمترین موادی هستند که در این امر به شما کمک می کنند.

شکستگی در حفره لگن نیاز به حدود ۳ ماه زمان برای جوش خوردن دارد.

معمولاً بعد از این مدت می توانید بدون کمک عصا، پای خود را کاملاً به زمین گذاشته و راه بروید برای راه رفتن به غیر از یک استخوان جوش خورده و یک مفصل سالم، نیاز به عضلات قوی هم دارید و مفاصل هم باید حرکت مناسبی داشته باشند. اگر در مدت زمان بعد از جراحی حرکتی را که پزشک یا فیزیوتراپ آموزش داده است بطور مرتب انجام بدهید حرکات مفصل در اکثر موارد به حد قبل از شکستگی برگشته و قدرت عضلات هم تا حدودی حفظ می شوند. تنها در این زمان است که می توانید پایتان را کاملاً به زمین گذاشته و راه بروید.

به علت وزن نگذاشتن روی پای جراحی شده در سه ماه بعد از حادثه، عضلات اندام تحتانی تا حدودی ضعیف می شوند. در نتیجه ممکن است حتی بعد از اینکه بتوانید بدون عصا راه بروید، به علت همین ضعف عضلات، تا مدتی در حین راه رفتن لنگش داشته باشید به یاد آورید که عضلات نقش مهمی در راه رفتن طبیعی دارند و تا زمانی که نتوانید قدرت و هماهنگی عضلات را مجدداً بدست آورید لنگش ادامه خواهد داشت.

نگران نباشید اگر طبق دستور پزشک و فیزیوتراپ به راه رفتن و نرمشهای خود ادامه دهید راه رفتن به حد طبیعی باز خواهید گشت.

شکستگی های حفره لگن نوعی از شکستگی های لگن هستند که همانطور که از نامشان پیدا است در حفره ایی واقع در لگن خاصره ایجاد می شوند

علت این شکستگی ها معمولا "تصادف اتومبیل یا سقوط از بلندی است. غالبا این شکستگی نیاز به عمل جراحی دارند. بعضی از شکستگی ها نیز با کشش و گذاشتن وزنه درمان می شوند.

چند روز پس از عمل جراحی، بیمار از بیمارستان مرخص شده و به منزل می روید.

### **در این مدت باید به نکات مهمی توجه کنید که عبارتند از:**

تا مدتی بعد از جراحی ممکن است درد مختصری در محل جراحی احساس شود که بتدریج در یک تا دو هفته اول بعد از عمل از بین می رود. برای کاهش این درد پزشک معالج داروهای را تجویز می کند

باید هر گونه افزایش در شدت درد را که با مسکن، آرام نمی شود را به پزشک معالج اطلاع دهید.

ممکن است داروهای آنتی بیوتیک خوراکی تجویز شود تا در منزل استفاده کنید.

این داروهای به منظور پیشگیری از ایجاد عفونت احتمالی در محل جراحی باید مصرف شود.

داروهای برای جلوگیری از لخته شدن خون در ورید های اندام های تحتانی داده می شود که ممکن است تزریقی یا خوراکی باشند.

این داروها تا مدت زمانی که پزشک مشخص کرده است باید مصرف شوند.

لخته شدن خون در پاها از عوارض خطرناک شکستگی ها است. گاهی اوقات حتی با وجود مصرف این داروها، خون در ورید های عمقی پا لخته می شود.

علامت عمده این عارضه ورم کردن ساق است.

پس در صورت ورم کردن ساق، باید در اسرع وقت به نزدیک ترین مرکز درمانی مراجعه کنید تا توسط پزشک معاینه شوید.

در صورت تأیید لخته شدن خون در ساق، در بیمارستان بستری می شوید.

در چند هفته اول بعد از شکستگی ، باید بطور مرتب مچ هر دو پای خود را به بالا و پایین حرکت دهید.

هر دقیقه ده مرتبه هدف از این کار افزایش جریان خون در ساق است تا بدین وسیله از ایجاد لخته در ورید های عمقی پیشگیری شود.

پانسمانی که روی زخم ها گذاشته شده است باید توسط یک پرستار یا همراه بیمار که در بیمارستان آموزش دیده است بصورت روزانه تعویض شود.

معمولا" در هر روزی که پانسمان تعویض می شود لکه هایی در روی پانسمان مشاهده می شود که بر اثر ترشحات طبیعی زخم است.

این ترشحات ممکن است تا یکی دو هفته ادامه یابد و بعد از آن، ترشح زخم قطع شده و زخم به اصطلاح خشک می شود.

در این زمان دیگر نیاز به تعویض روزانه پانسمان وجود ندارد.



اگر ترشح زخم بعد از این مدت همچنان ادامه یافت، باید به پزشک معالج اطلاع دهید. در صورت داشتن علائم عفونت از جمله تب، لرز، قرمزی و خروج ترشح چرکی از ناحیه عمل شده و حساسیت در لمس به پزشک مراجعه کنید.

بخیه ها معمولا بعد از ۲ تا ۳ هفته از جراحی خارج می شوند. باید حرکاتی را که به شما توسط پزشک یا فیزیوتراپ آموزش داده شده است در منزل بطور مرتب انجام دهید تا مفاصل دچار خشکی نشوند.

می توانید با عصای زیر بغل یا توسط واکر راه بروید ولی نباید اندامی را که جراحی شده است به زمین بگذارید.

اگر قبل از اینکه شکستگی بطور کامل جوش بخورد، پای جراحی شده را به زمین بگذارید نیروی وزن شما به محل شکستگی اعمال می شود. در این حالت شدن نیروهای وارده به محل شکستگی ممکن است آنقدر زیاد باشد که پیچ و پلاک ها را جابجا کرده و در نتیجه قطعات شکستگی هم، جابجا شوند.

وقتی در تخت به پشت می خوابید می توانید برای راحتی بیشتر یک بالش را در زیر زانوهای خود قرار دهید یا وقتی به شانه طرف سالم می خوابید می توانید یک بالش را بین ساق های خود قرار دهید.

