




Bohlool Hospital

سیستوسکوپی



کارگروه آموزش به بیمار بخش جراحی ۲

واحد آموزش سلامت — بازنگری سوم

تنها در صورت مشاهده موارد زیر حتماً به پزشکتان مراجعه کنید:

۱. قرمز بودن رنگ ادرار در روزهای آینده
۲. وجود لخته های خون در ادرار
۳. عدم تخلیه ادرار تا ۸ ساعت بعد از پایان آزمایش
۴. وجود علائمی نظیر تب، درد شدید در ناف یا پهلو

نتایج عمل سیستوسکوپی چه زمانی اعلام می گردد؟

پس از این عمل پزشک تشخیص لازم را داده و با آگاهی از مشکل شما روند درمان را آغاز خواهد نمود. اما در صورت نمونه برداری یا انجام بیوپسی نمونه مورد نظر به آزمایشگاه پاتولوژی جهت بررسی دقیق تر ارسال می گردد.

پس از دریافت جواب پاتولوژی و مراجعه به پزشک، مشکل شما تشخیص داده و درمان مورد نظر جهت رفع مشکل شما آغاز خواهد شد..

[Www.Bohlool.gmu.ac.ir](http://www.Bohlool.gmu.ac.ir)

تلفن: ۰۵۱۵۷۲۳۶۸۳۵ بخش جراحی ۲: ۱۷۷۷



جهت دریافت محتوا
بارکدها را با تلفن
همراه اسکن نمایید.



مراقبت های لازم پس از انجام این عمل چیست؟

- ← سیستوسکوپی عموماً یک روش تشخیصی سرپایی است و شما همان روز به خانه می روید.
- ← اگر بعد از سیستوسکوپی کمی سوزش، درد مجاری و یا خون در ادرار داشته باشید، طبیعی است .
- ← اندکی سوزش در طول مجرا یا هنگام دفع ادرار تا چند روز بعد از سیستوسکوپی ادامه خواهد داشت .
- ← تغییر رنگ ادرار به صورتی رنگ، در صورت نمونه برداری، سوزش و تکرر ادرار پس از انجام این عمل طبیعی می باشد.
- ← سایر علائم می بایست در طی چند روز بهبود یابد در غیر اینصورت با پزشک خود تماس بگیرید.
- ← مصرف مایعات را افزایش دهید .
- ← آنتی بیوتیک های تجویز شده توسط پزشکتان را به طور منظم مصرف نمایید .
- ← استراحت کنید.

سیستوسکوپی در خانمها به چه منظور انجام می شود؟

← تعبیه و یا خارج کردن لوله حالبی

← التهاب مثانه

← بی اختیاری ادرار


← سرطان مثانه

← عفونتهای مکرر ادراری

← سنگ مثانه و.....

چگونه سیستوسکوپی انجام می شود؟

به شما گفته می شود که تمام لباسها و لباس های زیرتان را خارج نمایید و لباس مخصوص اتاق عمل بپوشید. روی تخت با پاهای از هم باز در وضعیتی که دسترسی به مجرای ادراری راحت باشد قرار بگیرید.



سیستوسکوپی یک روش ساده برای بررسی قسمت پایینی دستگاه ادراری می باشد که با آن داخل مثانه و مجرای ادراری معاینه می شود .

عمل سیستوسکوپی توسط اورولوژیست یا متخصص کلیه و مجاری ادراری جهت بررسی مثانه و مجرای ادراری برای تشخیص علت وجود خون در ادرار، تکرر ادرار و درد و سوزش در هنگام دفع ادرار ، و سایر مشکلات مثانه انجام می شود .

سیستوسکوپی معمولاً تحت بی حسی موضعی انجام می شود .

یک ژل مخصوص جهت بی حسی مجرای ادراری استفاده می گردد و بیهوشی خفیف که عمدتاً برای کودکان و جوانان بکار می آید.

سیستوسکوپی در آقایان به چه منظور انجام می شود؟

← بررسی و تشخیص وجود سنگ مثانه

← عفونت ادراری

← بزرگی خوش خیم پروستات

← تشخیص وجود تومور در مثانه

← بررسی و تشخیص تنگی و سنگ های موجود در مجرا

← تشخیص ناهنجاریهای مادرزادی سیستم ادراری

← تعیین وجود یا عدم وجود تومور در پروستات

← تعبیه و یا خارج کردن لوله حالبی

برای پیشگیری از درد سیستوسکوپی معمولاً تحت بیحسی موضعی انجام می شود یک ژل مخصوص جهت بیحسی

مجرای ادراری (پیشابراه) استفاده می گردد

بیحسی عمومی و یا نخاعی گاهی اوقات استفاده می شود.

در صورت نیاز به بیهوشی و یا بی حسی نخاعی بیمار می

بایست ۸ ساعت قبل از عمل ناشتا بوده و از مصرف مایعاتی

نظیر آب و چای نیز خودداری نماید.

در صورت استفاده از داروهای رقیق کنندهی خون و

داروهای ضد انعقادی مانند آسپرین، پلاویکس، وارفارین و ...

پزشکتان را حتماً مطلع کنید.

شب قبل از عمل حتماً استحمام کنید .

اگر توده ای دیده شود، پزشک متخصص می تواند به طور

کامل یا یک قسمت کوچکی از آن را خارج کند، به این کار

نمونه برداری یا بیوپسی می گویند لازم است نمونه جهت

بررسی به مرکز پاتولوژی ارسال شود.

وقتی کار تمام شد، وسیله مشاهده را خارج می کنند.