




Bohlool Hospital

تزریق آواستین

ویژه بیماران و همراهیان



کارگروه آموزش به بیمار بخش جراحی چهار

کد سند Bh-Mn/Pat Edu Pam//doc-04/05

بازنگری: ۱۴۰۳

دفعات بازنگری: ۵

Www.bohlool.gmu.ac.ir

♦ شش ساعت بعد از تزریق بیمار می‌تواند شستشوی صورت انجام دهد و منعی جهت وضو گرفتن و استحمام وجود ندارد، ولی حتی الامکان از ورود آب به داخل چشم جلوگیری شود.

♦ اثر داروی تزریق شده بلافاصله ظاهر نمی‌شود؛ بنابراین در صورت عدم افزایش بینایی بلافاصله بعد از تزریق، نیاز به مراجعه نمی‌باشد.

♦ محدودیت غذایی و فعالیتی خاصی وجود ندارد.

♦ نیازی به قطع آسپرین و یا سایر داروها، قبل و بعد از تزریق نمی‌باشد.

<https://www.mayoclinic.org>

ارتباط با ما و پاسخگویی به سوالات:

۰۵۱-۵۷۲۳۶۸۳۵

شماره داخلی بخش: ۱۱۵۵

WWW.BOHLOOL.GMU.AC.IR



جهت دریافت فایل، بارکد

را با تلفن همراه خود

اسکن نمایید.



مراقبت های بعد از تزریق آواستین

♦ دو ساعت بعد از تزریق، پانسمان چشم باز شود و بلافاصله ریختن قطره شروع گردیده و هر ۴ ساعت یک قطره (فقط در زمان بیداری) تا ۵ روز بعد ادامه یابد.

♦ بعد از تزریق در صورت درد میتوان از داروهای ضد درد مانند استامینوفون یا ژلوفن و ... استفاده نمود.

♦ در صورت افزایش درد، قرمزی جدید چشم و یا کاهش بینایی (نسبت به قبل از تزریق) فوراً به نزدیک ترین متخصص چشم و یا اورژانس مراجعه نمایید.

عوارض تزریق آواستین چیست؟

خوشبختانه بیمار با تزریق آواستین با عوارض خاصی مواجه نخواهد شد.

برخی از عوارض مانند درد جزئی در ناحیه تزریق، حالت تهوع، سردرد خفیف، ریزش اشک، قرمزی چشم، ایجاد خونریزی یا پارگی در شبکیه که به ندرت اتفاق می افتد می تواند مشاهده شود.



در اکثر موارد عارضه قابل توجهی پیش نخواهد آمد.


افرادی که به بیماری های چشمی دچار هستند و پزشک تشخیص داده است که نیازمند تزریق آواستین می باشند باید حتما طی مراجعات منظم تزریق را انجام دهند تا چشم بیش از این درگیر نشود چرا که به راحتی کم شدن دید و در نهایت کوری حاصل خواهد شد.

در این بین بیماران دیابتی باید اهمیت بیشتری به سلامت چشم خود دهند زیرا بیش از سایر بیماران در معرض خطر قرار دارند.

نحوه تزریق آواستین چگونه است؟

برای تزریق آواستین بیمار به اتاق عمل برده شده و پزشک متخصص چشم بدون انجام بیهوشی و تنها با ایجاد بی حسی عملیات مربوطه را به انجام خواهد رساند در نتیجه یک عمل سرپایی و سریع خواهد بود که انتظار می رود، فرد طی مدت کوتاهی به فعالیت های روزانه خود بازگردد و دوران نقاهت بلنمدتی را سپری نکند.

این تزریق توسط یک سر سوزن بسیار نازک و ظریف صورت می گیرد و با توجه به تشخیص پزشک با ایجاد چند روز فاصله بین تزریق دو چشم برای چشم دیگر انجام شود. پس از اتمام کار چشم یکی دوساعت پانسمان می شود.



آواستین یکی از دارو هایی که به شکل تزریق داخل چشمی در چند سال اخیر استفاده می شود. این دارو به چشم تزریق می شود تا به کاهش افت دید در این بیمار کمک کند.

در درمان بسیاری از بیماری های چشم مانند رتینوپاتی دیابتی ، انسداد وریدهای شبکیه ، ایجاد عروق خونی نابجا در مشیمیه و بسیاری دیگر از بیماری های شبکیه کاربرد دارد.

بسیاری از بیماریهای ذکر شده مزمن و طولانی مدت هستند ، به همین دلیل دوره درمان آنها نیز طولانی است و در این مدت باید بطور متناوب هر چند وقت یکبار تزریق داخل چشم تکرار شود ، همچنین بیماران نباید از این بابت نگرانی داشته باشند

رتینوپاتی دیابتی عارضه چشمی ناشی از دیابت است که به دلیل تغییرات ایجاد شده در رگ های خونی رخ می دهد و می تواند باعث تخریب شبکیه شده و در نتیجه تصویری که شبکیه به مغز میفرستد را تار کند.

آمیبول آواستین از ایجاد عروق جدید که در شبکیه چشم افراد دیابتی صورت می گیرد، جلوگیری می کند. آواستین توسط جراح چشم پزشک در اتاق عمل و در شرایط خاصی در چشم بیمار تزریق می شود.

