

- ❖ هر نوع حساسیت و سابقه آسم، دیابت، بیماریهای کلیوی و تیروئیدی، بیماری مسری، هپاتیت، سل، ایدز و... را حتماً به پزشک یا کارشناس انجام‌دهنده سی تی اسکن اطلاع دهید.
- ❖ سی تی اسکن‌هایی که بدون کنتراست انجام می‌گردد، نیاز به آمادگی قبلی نمی‌باشد و فقط بایستی هیچ شی فلزی در ناحیه عضو مورد نظر نباشد و اگر سی تی اسکن شکم و لگن بدون تزریق می‌باشد در یک هفته تا ده روز اخیر، بیمار سابقه رادیوگرافی‌هایی مانند ترانزیت، باریوم انما نداشته باشد.
- ❖ جهت انجام سی تی اسکن با تزریق، آزمایش (BUN/Creatinine) بیمار الزامی است.
- ❖ داروهای خود را طبق برنامه همیشگی تان مصرف کنید؛ البته به جز متفورمین (قطع این دارو از ۴۸ ساعت قبل از انجام آزمون الزامی است و مصرف دوباره قرص متفورمین به شرط عملکرد طبیعی کلیه‌ها پس از انجام آزمون با تزریق ماده حاجب بلا مانع است).
- ❖ اگر قرار است سی تی اسکن با ماده حاجب خوراکی انجام شود یک تا دو ساعت قبل از نوبتتان باید خوردن ماده حاجب خوراکی را شروع کنید. معمولاً ماده حاجب خوراکی را در یک بطری آب معدنی یک و نیم لیتری حل می‌کنند و شما هر ۱۵ دقیقه یکبار یک لیوان را میل می‌کنید. به صورتی که لیوان آخر دقیقاً قبل از انجام آزمون نوشیده می‌شود.
- ❖ داروی تزریقی از طریق آنژیوکت نصب شده در ورید دست تزریق می‌شود.
- ❖ در سی تی اسکن با تزریق ناشتایی ۲ تا ۳ ساعت قبل از انجام سی تی اسکن کافی است.
- ❖ برای دفع ماده حاجب، تا دو روز پس از انجام سی تی اسکن، حتماً روزی ۵ تا ۶ لیوان آب بنوشید.
- ❖ مادران شیرده باید تا ۲۴ ساعت پس از تزریق ماده کنتراست به فرزند خود شیر ندهند.
- ❖ زنان در صورت احتمال بارداری قبل از انجام سی تی اسکن حتماً باید پزشک یا کارشناس مربوطه را با خبر سازند.