

دکولمان جفت

ویژه مادران و همراهیان



کارگروه درون بخشی بخشی مامایی و زایشگاه

کد سند Bh-Mn/Pat Edu Pam//doc-04/06

بازنگری: ۱۴۰۴

دفعات بازنگری: ۶

Www.bohloul.gmu.ac.ir

آیا راهی برای پیشگیری از دکولمان جفت وجود دارد؟

۱. از استعمال دخانیات و مصرف مواد مخدری همچون کوکائین بپرهیزید
۲. در صورت ابتلا به فشار خون بالا حتما طبق نظر پزشک، از داروهای کاهنده فشار خون استفاده کنید.
۳. در صورت سابقه دکولمان جفت، به دلیل خطر عود، حتما به پزشک خود اطلاع دهید تا اقدامات مراقبتی زودتر برای شما در نظر گرفته شود.
۴. به هنگام رانندگی حتما از کمربند ایمنی استفاده کنید

<https://www.mayoclinic.org>
Chatgbt.com

شماره تماس: ۵۷۲۳۶۸۳۳-۰۵۱

داخلی ۱۱۰۰-۱۲۲۲

جهت دریافت فایل می توانید

بارکد روبرو را با تلفن همراه خود

اسکن نمایید.


تشخیص و درمان:

تشخیص دکولمان جفت با معاینه فیزیکی، سونوگرافی و بررسی ضربان قلب جنین انجام می شود. درمان دکولمان جفت بستگی به شدت جدایی جفت و وضعیت مادر و جنین دارد. درمان ممکن است شامل موارد زیر باشد:

نظارت دقیق مادر و جنین: در صورت جدایی جزئی جفت و عدم وجود علائم شدید، ممکن است پزشک نظارت دقیق را انتخاب کند.

تزریق خون و مایعات: برای جبران از دست رفتن خون.

زایمان زودرس: در بیشتر موارد، زایمان زودرس تنها راه نجات مادر و جنین است. روش زایمان (زایمان طبیعی یا سزارین) به



دکولمان جفت یا جدا شدن جفت یک وضعیت اورژانسی پزشکی است که در آن جفت پیش از زایمان، به طور جزئی یا کامل از دیواره رحم جدا می شود.

این جدایی می تواند خونریزی داخلی را ایجاد کند و برای مادر و جنین بسیار خطرناک باشد.

علل دکولمان جفت:

علت دقیق دکولمان جفت همیشه مشخص نیست، اما برخی از عوامل خطر عبارتند از:

فشار خون بالا (پره‌اکلامپسی یا اکلامپسی):

این وضعیت می تواند جریان خون به جفت را کاهش دهد و باعث جدایی شود.

ضربه به شکم: ضربه های شدید به شکم، مانند تصادف رانندگی، می تواند باعث دکولمان جفت شود.

سیگار کشیدن: سیگار کشیدن یکی از عوامل خطر مهم برای دکولمان جفت است.

مصرف کوکائین: استفاده از کوکائین نیز می تواند ریسک دکولمان جفت را افزایش دهد.

سابقه دکولمان جفت در بارداری های قبلی: اگر در بارداری های قبلی دکولمان جفت داشته اید، احتمال آن در بارداری های بعدی بیشتر است.

پارگی زودرس پرده های جنینی: اگر پرده های جنینی پیش از موعد پاره شود، احتمال دکولمان جفت بیشتر است.

اختلالات انعقادی خون: اختلالات انعقادی خون نیز می تواند ریسک دکولمان جفت را افزایش دهد.

چاقی: زنانی که چاق هستند، احتمال دکولمان جفت در آن ها بیشتر است.

سن بالای مادر: با افزایش سن مادر، احتمال دکولمان جفت بیشتر می شود.

علائم دکولمان جفت:

علائم دکولمان جفت می توانند متفاوت باشند و شدت آن ها نیز متفاوت است. برخی از علائم شایع عبارتند از:

درد شکمی:

درد شکمی شدید و ناگهانی، معمولاً در قسمت بالای شکم یا پشت، از علائم اصلی دکولمان جفت است. این درد ممکن است شبیه به گرفتگی قاعدگی باشد، اما شدیدتر است.

خونریزی واژینال:

خونریزی واژینال ممکن است جزئی یا شدید باشد. در برخی موارد، خونریزی ممکن است به طور کامل وجود نداشته باشد.

تندی ضربان قلب مادر:

به دلیل از دست رفتن خون و شوک.

کمبود اکسیژن جنین:

که می تواند منجر به کاهش ضربان قلب جنین شود.

سخت شدن شکم:

احساس سفتی و سفت شدن رحم.

شوگ هیپوولمیک:

در موارد شدید، از دست رفتن خون زیادی منجر به شوگ هیپوولمیک (کاهش حجم خون) می شود.