




Bohlool Hospital

## کیست تخمدان



کارگروه درون بخشی بخش مامایی

کد سند ۰۵/۰۴/Pat Edu Pam//doc-04/05

بازنگری: ۱۴۰۳

دفعات بازنگری: ۵

[Www.bohlool.gmu.ac.ir](http://Www.bohlool.gmu.ac.ir)

بیمار مبتلا به کیست تخمدان باید از مصرف مواد غذایی که حاوی کربوهیدرات‌های ساده هستند، به شدت اجتناب کند. مثلاً مصرف نوشابه، آبمیوه‌های صنعتی، کیک، آبنبات، بستنی، کلوچه و شیرینی را کم کند.

### ورزش کنید:

در زنان مبتلا به کیستهای تخمدانی، افزایش فعالیت روزانه و مهم‌تر و موثرتر از آن، شرکت در یک برنامه ورزشی منظم برای درمان و پیشگیری از مقاومت انسولین بسیار ضروری است. ورزش به شکل پیاده‌روی تندد است که ۵ روز در هفته و روزی نیم ساعت انجام شود.

### در صورت داشتن این علائم هشدار سریعاً مراجعه کنید:

درد شدید در لگن، تب، ضعف یا سرگیجه، تنفس سریع و پی در پی، این علائم می‌توانند نشان‌دهنده پارگی یک کیست یا پیچ خورده‌ی تخمدان باشد. در صورت تب، قرمزی، تورم، ترشح از محل زخم هرچه سریعتر به پزشک معالج خود مراجعه کنید.

<https://www.mayoclinic.org>

منبع: بارداری زنان و زایمان ویلیامز

شماره تماس: ۰۵۱۵۷۲۳۶۸۳۴

داخلی ۱۲۲۲

آدرس وبسایت: [Www.bohlool.gmu.ac.ir](http://Www.bohlool.gmu.ac.ir)



جهت دریافت فایل می‌توانید  
بارکد را با تلفن همراه خود  
اسکن نمایید

«معمول» روز بعد از عمل سوند ادراری خارج و به شما اجازه داده خواهد شد تخت خود را ترک کنید، در این صورت لازم است ابتدا ۱۵ دقیقه لبه‌ی تخت نشسته و پاهای خود را آویزان کنید.

در صورتی که سرگیجه نداشتید با کمک پرستار از تخت خارج شده و راه بروید.

«معمول» ۴۸-۲۴ ساعت بعد از عمل پانسمان تعویض و با صلاح‌حدید پزشک ترجیخ خواهد شد.

پس از ترجیخ تا یک هفته از غذاهای نفاخ مثل حبوبات و پیاز استفاده نکنید.

از مواد غذایی ملین و فیبردار مانند سبزیجات، میوه و روغن زیتون استفاده کنید تا از یبوست جلوگیری شود

از برداشتن اجسام سنگین (۴ کیلوگرم) و ایستادن به مدت طولانی خودداری کنید.

خانمهای در سنین باروری مطلع باشند در صورتی که جراح مجبور شود یک تخدمان شما را بردارد شما می‌توانید با یک تخدمان باردار شوید.

در صورتی که هر دو تخدمان برداشته شود، شما دچار یائسگی شده‌اید و باید در صورت صلاح‌حدید پزشکتان از جایگزینهای هورمونی استفاده کنید.

حتماً با جواب پاتولوژی جهت پیگیری درمان به پزشک خود مراجعه کنید.

### تاثیر سبک زندگی در بیماری کیست تخدمان

#### رژیم غذایی:

کربوهیدرات‌های با فیبر بالا مصرف کنید.

که در غذاهایی همچون نان‌های سبوس دار، جو، برنج قهوه‌ای و حبوبات یافت می‌شوند.

## **کیست تخمدان چیست**

کیست به کیسه‌هایی گفته می‌شود که درونشان از مایع پر شده است.

گاهی اوقات این مایع خونی یا چربکی است که شرایط بیمار را اندکی خطرناک‌تر و وخیم‌تر می‌کند.

کیست‌های تخمدان نیز به همین شکل هستند.

در کیست تخمدان کیسه‌هایی با غشایی نازک از مایعات پر می‌شوند، این کیسه‌های پر از مایع در نهایت در تخمدان قرار می‌گیرند. اندازه‌ی کیست‌های تخمدان می‌تواند به کوچکی نخود فرنگی و یا به بزرگی یک پرتقال باشد.

کیست‌های تخمدان اغلب در زمان تخمک‌گذاری ایجاد می‌شوند.

بیشتر کیست‌های تخمدان کوچک و بی خطر هستند و مکرراً در طی چرخه‌ی قاعدگی در سال‌های باروری زن به وجود می‌آیند.

در اثر خونریزی در کیست‌های تخمدانی کیست هموراژیک یا کیست خونی ایجاد می‌شود که به آن کیست خونریزی دهنده نیز می‌گویند.

این کیست به دنبال ایجاد اختلال در روند تخمک‌گذاری در زنانی که یائسه نیستند، ایجاد می‌شود.

در بیشتر موارد کیست‌های هموراژیک هیچ علائمی ندارند و با معاينه‌های لگنی و سونوگرافی تشخيص داده می‌شوند.

کیست‌ها میتوانند در تخمدان راست، چپ و یا هردوی آنها وجود داشته باشند. اگر این کیست‌ها به هر دلیلی پاره شوند، مایع و خون داخل آنها به داخل لگن و شکم نفوذ می‌کند.

خوبشختانه کیست تخمدان در ۹۵ درصد موارد خوش‌خیم است و به راحتی با دارو کنترل و درمان می‌شود.

معمولاً کیست تخمدان علامت یا نشانه‌ای ندارد، ولی برخی اوقات باعث ایجاد درد یا خونریزی در زنان می‌شود.

اگر قطر یک کیست بیشتر از ۵ سانتی‌متر باشد، برای خارج کردن آن از بدن ممکن است به عمل جراحی نیاز باشد.

## **علائم کیست تخمدان شامل موارد زیر است:**

- => نفخ شکم یا تورم در ناحیه شکمی
- => حرکات روده دردناک
- => درد لگن قبل یا بعد از چرخه قاعدگی
- => مقاربت دردناک
- => درد در ناحیه شکم، کمر یا ران
- => حساسیت سینه
- => تهوع و استفراغ


## **تشخیص کیست تخمدان چگونه است؟**

۱. علائم بالینی
۲. معاينه لگنی
۳. سونوگرافی
۴. ممکن است از لپاراسکوپ جهت تشخیص نوع کیست و برداشتن کیست استفاده شود.

## **درمان کیست تخمدان چیست؟**

در کیست‌های کوچک و ساده و تخمدان پلی کستیک از داروهای ضد بارداری خوراکی برای سرکوب فعالیت تخمدان و کوچک شدن کیست استفاده می‌شود.

در کیست‌های بزرگ، مرکب، مشکوک و دارای اجزاء سفت و جامد، عمل جراحی انجام می‌شود.



## **مراقبتهاي قبل از عمل**

۱. در صورت اورژانسی بودن عمل جراحی ناشتا بمانید.
۲. اگر عمل جراحی اورژانسی نبود می‌توانید شام سبک میل کنید و از ساعت ۱۲ شب ناشتا بمانید.
۳. برای شما آزمایش خون و رزو خون انجام می‌شود.
۴. شب قبل از عمل جهت کاهش احتمال عفونت استحمام کنید و طلا و جواهرات، اجسام فلزی، گیره سر، لنز دندان مصنوعی را خارج کنید.
۵. عمل شما تحت بیهوشی عمومی یا نخاعی انجام می‌شود.
۶. در صورتی که تحت درمان بیماریهای مزمن مانند (دیابت، فشارخون و غیره) هستید به پزشک یا پرستار خود اطلاع دهید زیرا در برخی موارد لازم است داروهای شما موقتاً قطع یا با داروی دیگری جایگزین شود.

## **مراقبتهاي بعد از عمل:**

- => تا چند ساعت بعد از عمل نباید چیزی بخورید.
- => از زمانی که پرستار به شما اجازه داد، ابتدا رژیم مایعات را شروع کرده و به تدریج با نظر پزشکتان رژیم معمولی را شروع کنید.
- => درد بعد از عمل طبیعی است و پرستار شما با استفاده از مسکن‌های تجویز شده در تسکین درد به شما کمک می‌کند.
- => بی حرکتی پس از عمل می‌تواند سبب رکود خون در پاهای و افزایش احتمال عفونت ریه گردد. لذا توصیه می‌شود بعد از عمل تنفسهای عمیق داشته باشید، سرفه‌های موثر داشته باشید و اندام‌های تحتانی را در تخت حرکت بدھید و چرخش پاهای را مرتبًا“ انجام دهید.